

Onkruidbestrijding tarwe

Op vroeg gezaaide percelen tarwe kunnen al vroeg grotere onkruiden komen te staan. Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting tijdig uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Cossack Star + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1,0 l/ha Olie.

De olie dient een veresterde plantaardige olie te zijn: bijv. Tipo-olie. Deze middelen kunnen het best gespoten worden bij groeizaam weer met een hoge RV.

Voor verder ontwikkelde tarwe zou er eventueel 1,0 l/ha CeCeCe kunnen toegevoegd worden. Raadpleeg uw adviseur voor een passend advies.

Onkruidbestrijding Wintergerst

Door het zeer natte najaar is op sommige percelen wintergerst de onkruidbestrijding niet meer gelukt. Onkruiden kunnen hierdoor al verder ontwikkeld zijn, bestrijding hiervan kan met:

- 1l/ha Tapir
- 1l - 1,5l/ha Primstar
- 1,5l/ha Fox480SC + 1,5l MCPP (bestrijding ereprijs, bij Fox 480sc DRT 97,5%)
- 1,2l/ha Axial 50 (voor bestrijding van straatgras, raaigras en duist)

Vraag uw adviseur voor een passend advies

Onkruidbestrijding graszaad

Als de grond berijdbaar is kan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd om onkruiden zoals klein kruiskruid, kamille en klimopereprijs tijdig te bestrijden. Hierbij kunnen combinaties van Primstar, Primus, Starane Top, Tapir of Fox worden ingezet. Enkel voor Engels Raaigras heeft Fox480SC geen toelating. Ook een nieuw middel maakt zijn intreden, de Renitar. Dit middel is zowel toegelaten in graszaad als in winter- en zomergraan. De Renitar dient toegepast te worden in een dosering van 0,75l/ha met een DRT 95% en werkt sterk tegen paarse dovenetel, hoenderbeet, melganzevoet, kleefkruid.

Algemeen breed advies:

- 1,5l/ha Tapir + 0,75l/ha Renitar (+ 1l/ha Oblix 500)
- 1l/ha Primstar + 0,75l/ha Renitar (+ 1l/ha Oblix 500)

Onkruidbestrijding vlas

Spuit direct na zaai 0,75 - 1,0 l/ha Callisto + 1,0l/ha Challenge + 0,3 l/ha Grounded. Let op: Callisto en Challenge hebben een KUG-toelating: het toepassen hiervan is op eigen risico.

Rudis in uien

Tegen grondgebonden ziekten zoals Fusarium en Wltrot kan zowel in plantuien als zaaiuien een grondbehandeling met Rudis voor het planten of zaaien worden ingezet. Deze grondbehandeling kan een reductie van beide aantastingen bewerkstelligen. De dosering is 0,6 l/ha Rudis, dient voor de laatste grondbewerking te worden toegepast. Aan deze bespuiting kan eventueel 5l/ha Serenade worden toegevoegd voor een versterkende werking. Serenade kan ook solo worden gespoten in een dosering van 10l/ha.

Belem bij zaai

De bestrijding van Uien- en bonenvlieg kan in de teelt van uien door middel van 12kg/ha Belem toe te passen in de rij. Daarnaast heeft Belem ook een werking tegen Ritnaalden. Ook voor de bieten teelt is Belem daarvoor te gebruiken.

Raadpleeg uw adviseur voor de juiste manier van toepassing.

Onkruidbestrijding plantuien

Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies:

- 2,0 - 3,0l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ500 (bij hoge meldedruk) of
- 2,0 - 3,0l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 (bij bingelkruid; duivenkervel)

Vraag uw adviseur voor een passend advies.