



## Plantuien

Bij droge en afgeharde omstandigheden kan met contactmiddelen bovenstaand onkruid bestreden worden. Bij aanwezigheid van kamille of varkensgras kan dit met:

- 0,25 l/ha Basagran + 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,12 - 0,18 l/ha Starane Top

Bij aanwezigheid van kruiskruid, melde (uitstaande) of kroontjeskruid kan gespoten worden met:

- 0,25 l/ha Emblem Flo + 0,25 - 0,5 l/ha Lentagran + 0,12 - 0,18 l/ha Starane Top

Als de omstandigheden weer vochtig worden, kunnen bodemherbiciden weer aangevuld worden met bijvoorbeeld:

- 1,0 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Pyramin + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500

## Zaaiuien

De stand van de percelen in ons gebied is zeer verschillend: van net gezaaid tot bijna vlagbladstadium en zeer wisselende opkomst binnen een perceel. In het kramstadium kan onder de huidige droge omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden, bijvoorbeeld:

- 0,15 - 0,3 l/ha Emblem Flo + 0,1 l/ha Starane Top

Emblem Flo kan ook vervangen worden door Bromotril. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Bij voldoende vocht kunnen bodemherbiciden worden aangevuld:

- 0,25 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of
- 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500

In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met de volgende combinatie:

- 0,25 - 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC

## Onkruidbestrijding witlof / cichorei

Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):

- 1<sup>e</sup> bespuiting (kiemplant):  
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Legurame + 0,5 l/ha Chloor IPC + 30 - 50 ml/ha AZ 500
- 2<sup>e</sup> bespuiting (1<sup>e</sup> blad):  
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Chloor IPC + 5 - 10 gr/ha Safari + 50 - 70 ml/ha AZ 500
- 3<sup>e</sup> bespuiting (2<sup>e</sup> blad):  
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Legurame + 0,5 l/ha Chloor IPC + 70 - 100 ml/ha AZ 500
- 4<sup>e</sup> bespuiting (3<sup>e</sup> blad):  
0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 l/ha Chloor IPC + 5 - 10 gr/ha Safari

AZ 500 kan aan het LDS-systeem worden toegevoegd en is een versterking op kamille, klein kruiskruid en meldes. Vanaf het 3-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima (bij hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 l/ha Dual Gold (bij kamille, zwarte nachtschade en bingelkruid).

In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:

Product	Maximale dosering per keer	Maximaal aantal toepassingen	Maximale dosering per teelt	Minimale interval (dagen)
Kerb Flo	0,25 - 2,5 l/ha	5	3,75 l/ha	5
Legurame	7,0 l/ha	2	14 l/ha	14
Chloor IPC	0,5 - 1,0 l/ha	12	4 - 6 l/ha	5
Dual Gold	0,1 - 0,3 l/ha	6	1,3 l/ha	5
Safari	10 - 30 gr/ha	4	60- 120 gr/ha *	7
Frontier	0,3 - 0,45 l/ha	3/2	0,9 l/ha	7
AZ 500	0,04 - 0,2 l/ha	3	0,2	6

\*max dosering safari in witlof 60 gr/ha; in cichorei max 120 gr/ha

## Onkruidbestrijding in aardappelen

Na het frezen kan op een bezakte, vochtige rug een bodemherbicide worden toegepast. Als allround combi voor zowel pootgoed als consumptie adviseren wij:

- 4,0 l/ha Boxer + 0,5 - 0,75 l/ha Sencor

Bij niet Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) kan de volgende combinatie:

- 4,0 l/ha Boxer + 1,0 - 1,5 l/ha Afalon

Als veel melden worden verwacht kunnen de volgende combinaties worden toegepast:

- 2,5 l/ha Challenge + 1,5 l/ha Afalon (ruim voor opkomst spuiten) of
- 2,5 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman + 1,5 l/ha Afalon of 0,3 l/ha Sencor (tot opkomst)

Als veelknopigen het probleem zijn kunnen de volgende combinaties:

- 2,0 l/ha Challenge + 175 ml/ha Centium + 1,5 l/ha Afalon of 0,3 l/ha Sencor (deze combinatie dient ook ruim voor opkomst gespoten te worden) of
- 3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 20% opkomst)

Enkele algemene opmerkingen:

Proman heeft een breed onkruidspectrum, is zeer veilig en zacht voor het gewas (ook toelating in pootaardappelen) en kent geen rasbeperkingen.

Centium, Challenge en Linuron (Afalon) dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten te worden. Let op dampwerking van Boxer en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of boomgaarden.

## Toelating Afalon / Datura (Linuron)

De uitverkoop van Afalon en Datura (Linuron) is mogelijk tot en met 30 april 2017. Beide producten mogen opgebruikt worden tot 1 september 2017.

## Wintertarwe

Blijf uw wintertarwe goed controleren op de aanwezigheid van ziekten. Gele roest die vaak latent aanwezig is, komt in sommige rassen voor en kan bij warme en vochtige omstandigheden snel uitbreiden. Zie voor de bestrijding van gele roest de vorige nieuwsbrief of vraag uw adviseur.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoordelijkheid ligt.