



## **Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen**

In zomertarwe kan als de eerste knoop voelbaar is een halmverkorting uitgevoerd worden met 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Moddus of met 0,75 l/ha Medax Top. Komt er op het moment van spuiten gele roest of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,0 l/ha Soleil + 1,0 l/ha Daconil toevoegen aan de bespuiting. Op lichte gronden kan ook nog Mangaan toegevoegd worden.

In zomergerst kan op het 1<sup>e</sup> knoopstadium geremd worden met 0,4 - 0,6 l/ha Moddus. De ziektebestrijding kan uitgevoerd worden met één keer 1,0 l/ha Aviator Xpro in het vlagbladstadium of 2 x 0,6 l/ha Aviator Xpro, waarbij de eerste bespuiting aan de remming wordt toegevoegd. Ook hieraan kan Mangaan toegevoegd worden.

## **Onkruidbestrijding maïs**

Onkruidbestrijding in maïs bestaat meestal uit een mix van middelen met contact-, bodem- en grassenbewerking. Een brede mix voor onkruidbestrijding van breedbladigen met grassen en eventuele haagwinde is:

1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold + 0,6 l/ha Samson Extra 6% OD (+ 200 - 300 g/ha Casper of 20 gr/ha Peak of 0,7 l/ha Kart)

Callisto bestrijdt de breedbladigen; Gardo Gold is een bodemherbicide die nodig is om de nakiemers te bestrijden; Samson bestrijdt de grassen, zoals kweek, straatgras en hanepoot. De toevoegmiddelen Casper en Peak (kamille/haagwinde) en Kart (haagwinde en aardappelen) zorgen voor extra aardappelwerking of Lontrel voor bestrijding van (melk-)distel.

## **Suikerbieten en borium**

Een tekort aan borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een lagere suiker- en financiële opbrengst.

Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF. Hieraan kan mangaannitrat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te voegen, zoals 0,5 kg/ha Pirimor. Solubor DF alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd.

## **Onkruidbestrijding na opkomst in aardappelen**

Als de aardappelen boven komen en er nog onkruid aanwezig is, kan men met een LDS-systeem nog een onkruidcorrectie uitvoeren. Er is keuze uit:

- 30 - 40 gr/ha Titus + 100 - 150 cc/ha Basagran + uitvloeier
- 70 - 100 cc/ha Sencor + 100 - 150 cc/ha Basagran

De toepassing van Basagran kan bij gevoelige rassen wat verbranding geven. Als er in de avond gespoten wordt is de kans op reactie het minste. Basagran heeft alleen contactwerking zonder nawerking. Deze onkruidbestrijding kan uitstekend worden gecombineerd met Phytophthora-middelen zoals Orvego, die het uitvloeien bevordert.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.