



## **Onkruidbestrijding Engels raaigras**

Om o.a. duist, straatgras en breedbladigen te bestrijden kunt u direct na zaai een bespuiting uitvoeren met 3 - 4 l/ha Tramet 200 EC. Ook na opkomst vanaf 2 - 3 spruiten raaigras kan deze bespuiting alsnog uitgevoerd worden.

## **Slakkenbestrijding**

Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Derrex is een voordelige drooggeperste korrel. Deze voldoet uitstekend om slakken te bestrijden in gewassen zoals graszaad en granen.

### *Werking:*

Na opname van een korrel stopt de vraat direct. De slakken zoeken een schuilplaats, veelal in de grond, en gaan daar na enkele dagen dood.

### *Advies Derrex:*

- Strooien zodra slakken worden waargenomen of meezaaien als slakkenvraat wordt verwacht.
- Dosering 7 kg/ha
- De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken worden waargenomen.

## **Wintergranen**

Binnenkort is het weer tijd om wintertarwe te zaaien. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst, ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur en bekijk daarbij de opbrengsten van ons tarweproefveld. Op dit moment kunnen we nog alle rassen leveren. Heeft u de voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen leveren.

Van wintergerst kunnen we diverse rassen aanbieden, eventueel ontsmet tegen gerstevergelingsvirus.

## **Loofdoding van consumptieaardappelen**

Momenteel zijn de omstandigheden zodanig dat er voldoende vocht rond de knollen zit en er dus veilig Reglone gebruikt kan worden.

### *Advies bij de huidige vochtige omstandigheden:*

- Op een afrijpend gewas kan 2,5 - 4,0 l/ha Reglone worden toegepast
- Op een nog groen en zwaar gewas verbetert een splittoepassing het resultaat. Spuit het gewas open met Reglone (2,0 l/ha), na drie tot vijf dagen gevolgd door nogmaals Reglone (2,0 l/ha)

Reglone toepassen met minimaal 400 l/ha water. Van Reglone is de maximale dosering per teeltcyclus 4,0 l/ha, en mag 2 maal per teeltcyclus worden toegepast. Indien nodig kan ook Reglone Bold worden ingezet (maximaal 4,0 l/ha en 1 toepassing per teeltcyclus).

Voeg bij het doodspuiten altijd een knolbeschermend phytophthora-middel (0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas) toe.

## Gewasbeschermingsmonitor

U bent verplicht om binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Met deze monitor dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt. Het gaat daarbij onder meer om de teeltfrequentie en de voorvrucht (vruchtwisseling), rassenkeuze en uitgangsmateriaal en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Ook moet u aangeven welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en welke emissiebeperkende maatregelen getroffen zijn.

De verplichting tot het bijhouden van de monitor ligt *bij de teler*. Telers met uitsluitend minder dan twee hectaren gras- of maïsteelt hoeven geen monitor bij te houden.

Voor diegene die nog een gewasbeschermingsmonitor moeten invullen, hebben wij exemplaren beschikbaar. Vraag uw adviseur om een gewasbeschermingsmonitor.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.