



Suikerbieten

De suikerbieten zijn de laatste week hard gegroeid. Controleer voor sluiten van het gewas of er nog onkruiden aanwezig zijn en voer eventueel een laatste bespuiting uit aangevuld met Dual Gold (max. 1,5 l/ha) of Frontier (max. 0,9 l/ha).

Melk- en/of akkerdistel en klein hoefblad kunnen in een aparte bespuiting worden bestreden met 1,2 l/ha Lontrel + 1 l/ha Olie.

Ziektebestrijding capucijners

In capucijners kan men bij bloei, wanneer de eerste bloemblaadjes vallen, preventief een bespuiting uitvoeren tegen botrytis en sclerotinia. Toegelaten hiervoor zijn:

- Switch (1 kg/ha - 2 toepassingen)
- Prosaro (1 l/ha - 1 toepassing)
- Scala (1,5 l/ha - 2 toepassingen)

Voor de erwtenpeulboorder kan men een bespuiting uitvoeren met 300 cc/ha Decis. Kwade harten kan men voorkomen door tijdig te starten (begin bloei) met 1 l/ha Mangaannitrat te spuiten. Bladluizen kunnen goed bestreden worden met 0,5 kg/ha Pirimor.

Aardappeltopluis

Rond 10 - 15 juni kan de aardappeltopluis het jonge aardappelgewas aanpakken, wat later in het seizoen zichtbaar wordt in de vorm van toprol. Bestrijding moet preventief gebeuren in een jong gewasstadium.

Teppeki is zeer selectief en heeft een zeer lange duurwerking, waardoor hij vroeg inzetbaar is. Calypso en Gazelle hebben een goede duurwerking en tevens een werking tegen de coloradokever. Ons advies:

- Teppeki 160 gr/ha
- Calypso 150 ml/ha
- Gazelle 250 gr/ha
- Pirimor 250 gr/ha

Pirimor is weer toepasbaar op percelen die grenzen aan oppervlaktewater, indien gebruik gemaakt wordt van 95% driftreducerende doppen en een teeltvrije zone van 1,0 meter. Middelen zoals Karate Zeon, Decis en Sumicidin Super hebben een goede werking van ongeveer twee weken, maar sparen geen natuurlijke vijanden. Veelal ontstaan hierdoor aantastingen door vuilboomluis of wegedoornluis na inzet van deze middelen. Ook mogen deze middelen niet in bloei.

Fusarium in tarwe

De meeste tarwe-rassen staan in bloei. Als het tijdens de bloei van de tarwe (7 - 10 dagen) regelmatig regent, en er een bladnatperiode van 24 uur of langer is, is er een verhoogd risico op een infectie door fusarium. Een bespuiting rond een infectieperiode kan de schade reduceren. Op percelen tarwe met als voorvrucht tarwe of maïs is er een verhoogd risico op fusarium.

Advies: 2,0 l/ha Osiris of 1,2 l/ha Soleil. (Soleil mag 1 keer per seizoen).

Beide middelen hebben ook een werking op roest en septoria.

Trips in plantuien

In plantuien worden sporadisch enkele volwassen trips gevonden. Deze leggen eieren waar later de larven uitkomen die schade in de uien veroorzaken. Movento heeft een goede werking op de trips-larven en dient preventief te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Movento heeft een systemische werking en bestrijdt daarvoor de larven van "binnenuit", en is veilig voor de natuurlijke vijanden van de trips.

Ons advies: 0,5 l/ha Movento.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.