



## **Onkruidbestrijding in aardappelen**

Voor de adviezen in pootgoed, vroege of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt worden in Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen.

De adviezen zijn als volgt:

### Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant)

- 0,5 - 0,75 l/ha Sencor + 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwaluwtong en melden.
- 0,5 - 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwarte nachtschade en melden.

### Consumptieaardappelen (niet-Sencor-tolerant)

- 2,0 - 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwarte nachtschade en melden.
- 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst).

### Pootgoed (Sencor-tolerant)

- 0,5 - 0,75 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman
- 0,5 - 0,75 l/ha Sencor + 4,0 l/ha Boxer

### Pootgoed (niet-Sencor-tolerant) + vroege aardappelen

- 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst)
- 2,0 - 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen)

Enkele algemene opmerkingen:

- Smit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond
- Proman heeft een breed onkruidspectrum, is zeer veilig en zacht voor het gewas en kent geen rasbeperkingen.
- Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten te worden. Let op dampwerking van Boxer en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of boomgaarden.

## **Vlas**

Bij het huidige schrale en zonnige weer zien we regelmatig vreterij van insecten in het vlas. Deze kunnen de kiembladeren en later de groeitoppen aanvreten. Controleer uw gewas en spuit eventueel een pyrethrolde:

- 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing)
- 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen)

## **Onkruidbestrijding capucijners**

In capucijners kan op klein onkruid gespoten worden met 0,5 - 1,5 l/ha Basagran + uitvloeier. Deze bespuiting kan één keer worden herhaald. Later kan nog Corum ingezet worden: 1 maal 1,25 l/ha of 2 maal 0,625 l/ha.

Wanneer men vreterij van de bladrandkever constateert kan men een behandeling uitvoeren met 0,3 l/ha Decis, drie dagen voor de onkruidbestrijding.

Vanaf ongeveer zes blaadjes kan ook een bespuiting met 1,0 - 2,0 l/ha Mangaannitrat uitgeoefend worden. Tegen kwade harten kan bij begin en half-bloei ook een mangaanbespuiting effectief zijn.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.