



Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting)

Bij de vroeggezaaide tarwe komt het vlagblad nu tevoorschijn. Kijk niet naar de lengte van de tarwe, maar naar het stadium “vlagblad volledig uit” (T2) en het tijdstip van de vorige bespuiting. De werkingsduur van de eerste fungicidebespuiting (T1) bedraagt bij gebruik van de volle dosering maximaal 3 à 4 weken.

Middelen met een lange werkingsduur:

- 2,0 l/ha Ceriax
- 1,1 l/ha Ascra Xpro

Bij aanwezigheid van graanhaantje en/of bladluizen:

- 0,05 l/ha Karate Zeon
- 200 cc/ha Sumicidin Super
- 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje)
- 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel)

Overbemesting tarwe

De stand van de tarwe is door het droge voorjaar zeer wisselend. Wanneer nog onvoldoende N is aangewend, of er voldoende N in de mest aanwezig was, of het te droog is voor een kunstmestgift, kan het tekort aan stikstof aangevuld worden met vloeibare bladmeststoffen.

Ons advies is:

Wanneer het vlagblad uit is kunt u spuiten met:

- 20 - 30 l/ha Efficie-N-t 28 (7 - 10,5 kg N) of
- 40 - 50 l/ha Next N18MgS of Powerleaf (9 - 11 kg N)

Efficie-N-t 28 bevat alleen stikstof in de vorm van ureum, terwijl Next N18MgS naast amidestikstof ook bestaat uit zwavel en magnesium.

Toepassing van de bladmeststoffen:

- Spuit met maximaal 200 liter spuitvloeistof
- Spuit op een droog gewas met een fijne druppel

Next N18MgS is niet mengbaar met fungiciden in verband met verbranding.

Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen

In *zomertarwe* kan tussen het stadium einde uitstoeling en de eerste knoop een halmverkorting uitgevoerd worden met 1,0 l/ha CeCeCe of met 0,4 - 0,5 l/ha Prodx. Komt er op het moment van spuiten gele roest of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,0 l/ha Soleil + 1,0 l/ha Daconil (Alternil) toevoegen aan de bespuiting. Op lichte gronden kan ook nog Mangaan toegevoegd worden.

In *zomergerst* kan op het 1^e knoopstadium geremd worden met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx. De ziektebestrijding kan uitgevoerd worden met 1 maal 1,1 l/ha Ascra Xpro + 0,7 l/ha Alternil in het vlagbladstadium of 2 maal 0,6 l/ha Ascra Xpro, waarbij de eerste bespuiting aan de remming wordt toegevoegd en aan de tweede ziektebestrijding 0,7 l/ha Alternil wordt toegevoegd. Ook hieraan kan mangaan toegevoegd worden.

Bruine bonen

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8,0 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen.

Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Boxer. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.