



Grassenbestrijding

Als straatgras en/of andere grassen bestreden moeten worden, kan er een bespuiting uitgevoerd worden met Gallant of Centurion Plus.

Advies Gallant:

- Bestrijding van gras- en graanopslag: 0,5 -1,0 l/ha Gallant + 1,0 l/ha Olie
- Bestrijding van straatgras: 1,0 l/ha Gallant + 1,0 l/ha Olie

Advies Centurion Plus:

- Bestrijding van 1-jarige grassen en klein straatgras: 1,0 l/ha Centurion Plus
- Bestrijding van ontwikkeld straatgras (tot einde uitstoeiing): 2,0 l/ha Centurion Plus
- Bestrijding van kweek: 2,5 l/ha Centurion Plus

Als er geen straatgras aanwezig is, kan er ook gespoten worden met Focus Plus of Fusilade Max.

Suikerbieten

Nu de bieten wat groter worden kunt u de dosering wat verhogen, maar houd de intervallen kort. Voor de lengtewerking kunt u vanaf 4-bladstadium de bodemherbicide Dual Gold (0,5 l/ha) of Frontier Optima (0,45 l/ha) toevoegen.

Suikerbieten en borium

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. Boriumgebrek is te voorkomen door Borium te spuiten tussen het vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF. Hieraan kan mangaannittraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te voegen (zoals 0,5 kg/ha Pirimor). Solubor DF alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd.

Luizen in suikerbieten

In de regio worden steeds meer groene perzikbladluizen waargenomen. Controleer uw gewas goed op de groene perzikbladluizen en voer, indien nodig, een bespuiting uit met een van de volgende middelen:

- 0,4 kg/ha Pirimor
- 140 gr/ha Teppeki
- 0,15 l/ha Calypso / 0,15 l/ha Bariard
- 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Olie

Onkruidbestrijding na opkomst in aardappelen

Als de aardappelen boven komen en er nog onkruid aanwezig is, kan men met een LDS-systeem nog een onkruidcorrectie uitvoeren met:

- 30 - 40 gr/ha Titus + 100 - 150 cc/ha Basagran + 50 - 100 cc/ha Sencor + uitvloeier
- 70 - 100 cc/ha Sencor + 100 - 150 cc/ha Basagran

De toepassing van Basagran kan bij gevoelige rassen wat verbranding geven. Als er in de avond gespoten wordt is de kans op reactie het minst. Deze onkruidbestrijding kan uitstekend worden gecombineerd met Phytosphthora-middelen.

Onkruidbestrijding pootgoed na-opkomst

Citation (70% metribuzin) is het enige middel dat na-opkomst is toegelaten in pootaardappelen. De actieve stof metribuzin kan een loofreactie geven bij gevoelige rassen. Informeer daarom eerst bij uw handelshuis naar de rasgevoeligheid voor metribuzin, Citation mag na-opkomst 1x worden toegepast met maximaal 0,2 kg/ha.

Toelating Closer

Closer is toegelaten in aardappelen. Closer heeft een snelle knockdown-werking op luizen en daarnaast ook een lange duurwerking. Deze eigenschappen komen optimaal tot hun recht in de pootgoedteelt. Closer mag 1x worden toegepast met een dosering van 0,2 l/ha.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.