



Suikerbieten

De suikerbieten zijn de laatste week hard gegroeid. Controleer voor sluiten van het gewas of er nog onkruiden aanwezig zijn en voer eventueel een laatste bespuiting uit aangevuld met Dual Gold (max. 1,5 l/ha) of Frontier (max. 0,9 l/ha).

Melk- en/of akkerdistel en klein hoefblad kunnen in een aparte bespuiting worden bestreden met 1,2 l/ha Lontrel + 1,0 l/ha Olie.

Ziektebestrijding capucijners

In capucijners kan men bij bloei, wanneer de eerste bloemblaadjes vallen, preventief een bespuiting uitvoeren tegen botrytis en sclerotinia. Toegelaten hiervoor zijn:

- Prosaro (1,0 l/ha - 1 toepassing)
- Scala (1,5 l/ha - 2 toepassingen)

Voor de erwtenpeulboorder kan men bespuiting uitvoeren met 300 cc/ha Decis. Kwade harten kan men voorkomen door tijdig te starten (begin bloei) met 1,0 l/ha Mangaannitraat te spuiten. Bladluizen kunnen goed bestreden worden met 0,5 kg/ha Pirimor.

Aardappeltopluis

Rond 10 - 15 juni kan de aardappeltopluis het jonge aardappelgewas aanprikken, wat later in het seizoen zichtbaar wordt in de vorm van toprol. Bestrijding moet preventief gebeuren in een jong gewasstadium. Maak een keuze uit één van de onderstaande middelen:

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| • Teppeki | 160 gr/ha | 2 toepassingen, interval 21 dagen |
| • Calypso/Bariard | 150 ml/ha | 2 toepassingen, interval 7 dagen |
| • Gazelle | 250 gr/ha | 3 toepassingen, interval 21 dagen |
| • Pirimor | 500 gr/ha | 2 toepassingen, interval 10 dagen |

Fusarium in tarwe

De meeste tarwe-rassen staan in bloei. Als het tijdens de bloei van de tarwe (7-10 dagen) regelmatig regent, en er een bladnatperiode van 8 uur of langer is, is er een verhoogd risico op een infectie door fusarium. Een bespuiting rond een infectieperiode kan de schade reduceren. Op percelen tarwe met als voorvrucht tarwe of maïs is er een verhoogd risico op fusarium.

Advies: 1 l/ha Prosaro of 1,2 l/ha Soleil. (Soleil mag 1 keer per seizoen). Beide middelen hebben een werking op roest en septoria en houden het gewas langer gezond.

Trips in plantuien/zaaiuien

In plantuien/zaaiuien worden sporadisch enkele volwassen trips, maar ook larven gevonden. Het zijn de larven die schade in de uien veroorzaken. Movento en Batavia hebben een goede werking op de trips-larven, maar dienen *preventief* te worden gespoten onder groeizame omstandigheden.

Door de systemische werking van deze middelen worden de larven van "binnenuit" bestreden en worden de natuurlijke vijanden van de trips gespaard. Ons advies:

- 0,5 l/ha Movento of
- 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Olie

Toelating Pyramin

Van Pyramin vervalt de toelating. Degene die volgend jaar (opgebruiktermijn 30-06-2020) nog Pyramin willen gebruiken in suikerbieten of in zaai-/plantuien, dienen deze voor 30-06-2019 (aflevertermijn 30-06-2019) te bestellen. Aangekocht product kan niet meer geretourneerd worden.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.