



VAN OVERLOOP B.V.
gewasbeschermingsmiddelen

NIEUWSBRIEF

nr. 20

23 juli 2019

MH-besputting uien

De toepassing van MH is binnenkort weer aan de orde. Het juiste moment van toepassen en de omstandigheden tijdens toepassen bepalen voor een groot gedeelte het resultaat van de spruitremming. Lees onderstaande adviezen en vraag uw adviseur om een passend advies.

Het juiste moment voor de MH-besputting in uien:

Voor een goed resultaat is het belangrijk MH op het juiste moment toe te passen in een gewas met een regelmatige stand en afrijping. Spuit wanneer het gewas begint te strijken (maximaal 10-15%). Het loof neemt het middel dan goed op. Te vroeg spuiten (te weinig bladloze rokken) geeft losse rokken of holle uien, te laat spuiten kan leiden tot een verminderde opname van MH.

Omstandigheden tijdens toepassen:

Spuit op een groeiend en niet afgehard gewas. Spuit op een moment dat de RV minimaal 70% is. Na de besputting moet het minimaal 10 uur droog zijn.

Ons advies:

- 8,3 l/ha Crown MH + uitvloeier of
- 3,75 kg/ha Royal MH 60 + uitvloeier
- Spuit met 350 - 400 liter water per hectare met een fijne druppel voor een goede bladbedekking
- MH apart versputten onder groeizame omstandigheden
- Bij warme omstandigheden de besputting liefst 's avonds uitvoeren
- MH + uitvloeier niet mengen met andere middelen; wel kan eventueel een pyrethroïde tegen trips worden toegevoegd.

Het gewas moet na de besputting zeker 14 dagen groen en gezond blijven voor een volledige opname van de MH in de ui.

Kiemremming in consumptieaardappelen

Het moment van toepassen van MH in vroege bewaaraardappelen (b.v. Innovator) zal binnenkort aan de orde zijn. De toepassing van MH op het gewas vermindert en vertraagt het kiemproces van aardappelen tijdens de bewaring, waardoor het rendement toeneemt. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.

Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een belangrijk deel het eindresultaat in de bewaring bepaalt, staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste inzetmoment van MH:

- Spuitmoment: 3 - 5 weken voor verwachte loofdoding of afsterven van het gewas in verband met voldoende opname in de knol.
- Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei - begin afrijping. Controleer de knolgrootte: 80% minimaal 30 mm doorsnee.
- Spuit op een droog gewas bij groeizame omstandigheden. Dauwnat na de besputting is geen probleem. Bij warm weer in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het spuiten.
- MH altijd apart versputten met 300 - 500 l/ha water.
- Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.

Advies aardappelen:

- Crown MH: 11 l/ha of
- Royal MH60: 5,0 kg/ha

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.