



Bestrijding wortelonkruiden

In (gras)stoppelland heeft u een uitgelezen kans om wortelonkruiden aan te pakken. Benut deze kans dan ook om problemen in volgteelten te voorkomen. In groenbemesters die voor de G.L.B.-vergroening zijn ingezaaid mag 8 weken na de inzaaidatum (opgavedatum van inzaai) worden gespoten.

Let op dat niet alle middelen dan gespoten mogen worden: zie de aandachtspunten onder de tabel.

In onderstaande tabel staan van de meest voorkomende probleemonkruiden de bestrijdingsmethode:

Onkruid	Stoppel	Grasgroenbemester	Wachttijd
Aardappelopslag	4 l/ha Roundup Ultimate		1-2 weken
Akkerdistel	4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha MCPA	2 l/ha Mega 2,4-D	2-3 weken
Akkermelkdistel	4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha Mega 2,4-D	2 l/ha Mega 2,4-D	2-3 weken
Akkermunt	3,6 l/ha MCPA + 2 l/ha Mega 2,4-D	2 l/ha Mega 2,4-D	2-3 weken
Cichorei/Witlofopslag	4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha MCPA		1-2 weken
Klein Hoefblad	4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha Mega 2,4-D	2 l/ha Mega 2,4-D	2-3 weken
Kweek	3-4 l/ha Roundup Ultimate		1-2 weken
Moerasandoorn	4 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha Mega 2,4-D	2 l/ha Mega 2,4-D	2-3 weken
Paardenstaart/Heermoes	1 l/ha MCPA		2-3 weken
Veenwortel	4,5 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha Mega 2,4-D	99 cc/ha Primus	2-3 weken
Windesoorten	4,5 l/ha Roundup Ultimate + 2 l/ha Mega 2,4-D	99 cc/ha Primus	2-3 weken

Aandachtspunten:

- Mega 2,4-D mag in de periode van 1 september tot 1 maart niet op grasgroenbemesters en onbeteeld bloembollenland gebruikt worden. Wel mag Mega 2,4-D op tijdelijk onbeteeld land (stoppel) worden toegepast na 1 september, behalve als dit in een grondwaterbeschermingsgebied valt. Maximale dosering is 2 l/ha.
- MCPA mag op onbeteeld land (stoppel) na 1 september worden gespoten. De maximale dosering op onbeteeld land is 3,6 l/ha. In grasgroenbemesters heeft MCPA geen toelating.
- Menging van MCPA en Mega 2,4-D is mogelijk. Spuit groeistoffen (combinaties) liefst apart, d.w.z. liever niet samen met Roundup.
- Spuit ter bestrijding van akkerpaardenstaart (heermoes) die voldoende is ontwikkeld (20 cm) 1,5 - 2,0 l/ha MCPA.
- Op grasgroenbemesters mogen Primus (99 ml/ha) en/of Primstar (1 l/ha) worden toegepast. Dit betekent dat we ook in een grasgroenbemester wortelonkruiden (haagwinde, veenwortel) ideaal kunnen bestrijden. Let op: dit is niet toegelaten in stoppelbestrijding.
- Voer een bespuiting uit met groeistoffen op voldoende ontwikkelde onkruiden en onder groeizame omstandigheden (voldoende temperaturen en hoge RV) met 300 - 500 l/ha water.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.