



Onkruidbestrijding weiland

In de nazomer zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Zeker na de droge en warme zomer zijn er kale plekken ontstaan waar nu onkruid groeit. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden en onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties:

Een brede combinatie is:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij 1^e jaars grasland)

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro

Bij alleen zuring kan gespoten worden met:

- 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top

Loofdoding van consumptieaardappelen

Om de aardappels veilig dood te spuiten is de vochttoestand rond de knollen in de aardappelrug van belang. Bij onvoldoende vocht rondom de knollen is de kans op navelendrot groot en kan er dus niet met Reglone worden doodgespoten.

Hoe nu veilig uw aardappelloof te doden onder droge omstandigheden?

- Spuit op een (groen) gewas 1 l/ha Spotlight Plus. Gebruik bij deze bespuiting voldoende water (300-400 l/ha) en goede spuittechniek om gewas maximaal te raken. Spuit in de ochtend (eventueel dauwnat gewas) om maximaal van de daglengte (licht) te profiteren. Voeg hieraan een toe een phytothoramide met een goede knolbescherming, zoals 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas. In plaats van Spotlight Plus kan ook 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie gespoten worden.
- Na 4-5 dagen 3,0 l/ha Reglone spuiten.

Gebruik van Spotlight Plus heeft naast een veilige doding nog meer voordelen: uitstekende stengeldoding, beter loslaten van de knollen en beter en sneller huidvast worden van de knollen.

Als de omstandigheden de komende tijd eventueel voldoende vochtig worden, kan de loofdoding uitgevoerd worden met 2,5 - 4,0 l/ha Reglone.

Gewasbeschermingsmonitor

U bent verplicht om binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Met deze monitor dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt. Het gaat daarbij onder meer om de teeltfrequentie en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Ook moet u aangeven welke gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en welke emissiebeperkende maatregelen getroffen zijn.

De verplichting tot het bijhouden van de monitor ligt *bij de teler*. Telers met uitsluitend minder dan twee hectaren gras- of maïsteelt hoeven geen monitor bij te houden.

Voor diegene die nog een gewasbeschermingsmonitor moeten invullen, hebben wij exemplaren beschikbaar. Vraag uw adviseur om een gewasbeschermingsmonitor.

Ziektebestrijding bieten

De afgelopen weken met hoge temperaturen en lange dauwnachten waren ideaal voor infectie van bladschimmels (zie ook IRS-bladschimmelpagina; infectiewaarden cercospora). Controleer uw gewas goed en houd de intervallen en veiligheidstermijnen in de gaten.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.