



Kiemremming in aardappelen

Kiemremming in consumptieaardappelen kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

- Een Crown MH / Royal MH60 behandeling in het veld.
- Een inschuurbehandeling als de schil voldoende velvast is en er geen rooibeschatiging is met:
 - 1) 150 ml Gro-Stop Ready per ton aardappelen (VT = 2 maanden); bij een verlaagde dosering van 75 ml per ton geldt géén veiligheidstermijn.
 - 2) 60 ml Gro-Stop Basis per ton aardappelen (VT= 2 mnd); bij een dosering van 25 ml per ton is er geen veiligheidstermijn. Gebruik maximaal 60 ml Gro-Stop Basis in 120 ml water.
- Een ruimtebehandeling als er sprake is van schilbrandgevoelige rassen (zie schilbrandapp van Certis), beschadigde/niet-velvast aardappelen of bij zeer natte rooiomstandigheden (geopende lenticellen). De volgende verschillende systemen van gassen zijn mogelijk:
 - 1) Gassen met Gro-Stop Fog/ Tuberprop HN: starten na de wondheling met 25 ml per ton aardappelen, vervolgens herhalen om de 4 weken met 12,5 ml per ton. Totaal 8 toepassingen.
 - 2) Gassen met Gro-Stop Elektro
 - 3) Koudvernevelen met Tuberprop Ultra
 - 4) Gassen met 1,4Sight
 - 5) Gassen met Biox-M

Product	1,4Sight	Biox-M
Actieve stof	Dimethylnaftaleen 98% (kiemrustverlenger)	Zuivere groene muntolie 100%
Start toepassing	Enkele dagen na inschuren op een droog produkt	Start en interval afhankelijk van partij, MH en omstandigheden.
Dosering	10-20 ml per ton aardappelen Max 6 toepassingen	30-60 ml per ton aardappelen Max 11 toepassingen. 1 ^e toepassing 60 ml per ton, volgende toepassingen 30 ml per ton.
interval	4-6 weken	3 weken bij 6-9 graden bewaren, 4 weken bij 4-5 graden
toepassingsvoorwaarden	Schuur 48 uur gesloten houden na toepassing 2-3 keer per dag kort intern ventileren	Schuur 48 uur gesloten houden. Een aantal keren per dag kort intern ventileren
MRL	wel	geen
veiligheidstermijn	30 dagen	12 dagen
apparatuur	Toepassen met een Synafog	Toepassen met de Elektrofog
opmerkingen	Gebruik van 1.4 Sight in Mozart en Melody is voor eigen risico van de teler	

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Onkruidbestrijding in het najaar geeft de mogelijkheid om wortelonkruiden in het voorjaar goed aan te pakken. Voorwaarde bij de huidige middelen is wel dat het zaad na zaai goed bedekt is, anders moet de onkruidbestrijding na-opkomst plaatsvinden.

Ons advies voor wintertarwe:


- Direct na zaai bij goede bedekking van het zaad: 0,6 l/ha Herold (+ eventueel 0,2 l/ha AZ).
- Na opkomst van 1-2 bladstadium: 0,45- 0,6 l/ha Herold + insecticide of 2,0 l/ha Activus Super + insecticide. Als insecticide tegen bladluizen, die het gerstevergelingsvirus kunnen overbrengen, kan worden gebruikt: 0,25 l/ha Decis (2 toepassingen)

Ons advies voor wintergerst:

- 0,6 l/ha Herold + eventueel een insecticide

Slik op de weg

Diegene die de oogst binnenhaalt dient zijn best te doen om vervuiling van de weg te voorkomen, door zoveel mogelijk slik van de machines en tractors te verwijderen voordat deze de weg op gaan.



Boeren en loonwerkers zijn verplicht om andere weggebruikers met behulp van waarschuwingsborden te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, als er onverhoopt toch slik op de weg of op een fietspad komt. Vervolgens moet de vervuiling zo snel mogelijk worden opgeruimd. De vervuiler is altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg!

Van Overloop BV kan kunststof waarschuwingsborden leveren van goede kwaliteit (zie afbeelding). Deze kunnen jarenlang gebruikt worden.

De borden zijn voorzien van gaatjes aan de boven- en onderkant, zodat u ze makkelijk op een houten paal kunt schroeven of met een kabelbinder (tiewrap) kan bevestigen.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.