



### **Graszaad**

Fox 480 SC heeft per 1 maart 2020 weer een tijdelijke toelating in Engels raaigras. Deze tijdelijke toelating duurt tot en met 30 april 2019. Fox 480 SC (480 gr/l Bifenox) mag eenmaal na-opkomst worden toegepast in een dosering van 0,65 l/ha en is nodig om moeilijke onkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel te bestrijden.

### **Onkruidbestrijding tarwe**

Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 200 gr/ha Capri Twin + 1 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Cossack Star + 1 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Atalantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1 l/ha Olie

### **Groeiregulatie wintergerst**

De groeiregulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax. Het advies is:

- 0,8 l/ha Trimaxx
- 0,6 kg/ha Prodax bij 1<sup>e</sup> knoop en 0,6 kg/ha Prodax bij 2<sup>e</sup> knoop

Toevoeging van 1 - 2 l/ha Mangaannitrat is mogelijk.

### **Afbranden**

Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundup-bespuiting voorafgaand aan de groundbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5 - 3,0 l/ha Roundup Ultimate. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

### **Onkruidbestrijding plantuien**

Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies:

- 2,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ 500 (bij hoge meldedruk) of
- 2,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 (bij bingelkruid en duivekervel).

### **Onkruidbestrijding vroege wortelen**

Ons advies: 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Challenge. De laagste dosering van Centium geldt voor lichte gronden.

### **Onkruidbestrijding uien**

Advies: direct na zaai op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,75 - 1,5 l/ha Stomp (eenmalig). Bij twee toepassingen vóór opkomst is de maximale dosering 1,0 l/ha + 0,75 l/ha.

### **Onkruidbestrijding bieten**

Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide. Standaard advies:

- 2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 - 100 ml/ha Centium
- 2,0 - 3,0 kg/ha Pyramin (Pyramin niet mengen met Centium!)
- 3,0 l/ha Goltix Queen bij aanwezigheid van hondspeterselie, bingelkruid, kleeftkruid of melde.

### **Nieuw spuitseizoen**

Nu het nieuwe spuitseizoen voor de deur staat, is het ook tijd om uw persoonlijke veiligheids- en beschermingsproducten na te kijken. Zet nieuwe filters in uw gelaatsmasker of schaf een nieuw wegwerpmasker aan. Door deze na gebruik goed op te bergen in de afsluitbare folie, kan die een heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goed beschermende handschoenen.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.