



Bonalan in diverse gewassen

Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof en cichorei de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek.

Onkruidbestrijding cichorei/witlof

Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Spuut direct na het zaaien:

- 2,5 l/ha Kerb Flo + 2,0 l/ha Chloor IPC

(Poot)aardappelen

Tegen aardappelcystenaaltje en vrijlevend aaltje kan tijdens het poten Vydate 10G worden toegediend. De dosering is:

- 10 kg/ha Vydate in de rij of 20 kg/ha volvelds.

Vydate heeft tevens een goede luizenwerking, maar geen werking op ritnaalden. Door het wegvallen van Mocap 15G is Nemathorin 10G momenteel het beste alternatief tegen ritnaalden. De dosering is:

- 7,5 kg/ha Nemathorin 10G in de rij of 30 kg/ha volvelds.

Nemathorin 10G heeft een mindere werking op aardappelcystenaaltjes en luizen door de lage wateroplosbaarheid.

Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia tegen te gaan, kan tijdens het poten gebruik gemaakt worden van:

- 3,0 l/ha Amistar of
- 0,8 l/ha Allstar

Aan deze bespuiting kan ook een vloeibare fosfaat worden toegediend (zie nieuwsbrief 2 van 28 februari 2020)

Onkruidbestrijding blauw maanzaad

Direct na zaai een bespuiting met 0,15 l/ha Centium uitvoeren.

Ziektebestrijding/groeiregulatie wintertarwe

Vroeggezaaide tarwe en vroege rassen zijn ongeveer aan de eerste groeiregulatie (T0) toe. Deze bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd:

- 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Trimaxx of
- 1,0 l/ha CeCeCe of
- 0,3 - 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe

Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd:

- Bij aanwezigheid van gele roest: 1,2 l/ha Soleil of 1,5 l/ha Osiris of
- Bij aanwezigheid van septoria: 1,0 l/ha Daconil of 0,7 l/ha Alternil

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.