



Plantuinen

Bij de huidige afgeharde omstandigheden kan met contactmiddelen gespoten worden:

- 0,25 l/ha Basagran + 0,25-0,50 kg/ha Lentagran + 0,25-0,50 l/ha Emblem + 0,12 l/ha Starane Top.
- Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met:
 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 1,0 l/ha Wing P of
 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold

Vraag uw adviseur voor een passend advies.

Zaaiuien

De eerst gezaaide uien staan/komen boven. Probeer tijdig af te branden met Roundup Ultimate en voeg hier eventueel Stomp aan toe.

Wintergerst

Voer de tweede remming uit met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de eerste ziektebestrijding: 0,6 l/ha Ascra + 0,7 l/ha Alternil.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Indien men die bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Pyramin/Goltix en/of Centium, heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:

- 0,5 l/ha Goltix + 0,75 - 1,0 l/ha Betanal MaxxPro (opgebruik tot 1 juli 2020) of
- 0,5 l/ha BOGT of BOPT

Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de volgende middelen gespoten worden:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Calypso / Bariard	2	21 dagen	0,25 l/ha + uitvloeier

Vlas/Blauwmaanzaad

Bij het huidige schrale en zonnige weer is er kans op vreterij van trips in het vlas en/of blauwmaanzaad. Controleer uw gewas en spuit eventueel een pyrethroïde:

- 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing)
- 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen)
- 0,15 l/ha Calypso (max. 2 toepassingen, interval 14 dagen)

Onkruidbestrijding zomergranen

Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande combinaties:

- 1,0 - 1,5 l/ha Primstar + 1,5 - 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of
- 0,4 - 0,6 l/ha Starane Top + 30 - 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA

Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker- of haagwinde en cichorei- of witlofopslag kan 1,0 - 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir + 0,5 l/ha Primstar.

Als ook duist en windhalm bestreden moeten worden, kan alleen in zomertarwe:

- 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
- 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie

In zowel zomergerst als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen bestrijden met Axial 50 (0,9 - 1,2 l/ha) of met 1,0 - 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 l/ha Olie. Gebruik de hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen.

Onkruidbestrijding vroege aardappelen

Bij gebruik van Challenge tegen melden spuit direct na frezen met:

- 2,5 l/ha Proman + 3 l/ha Boxer + 1 l/ha Challenge

Ook kan tot opkomst gespoten worden met:

- 2,5 l/ha Proman + 3,5 l/ha Boxer