



Zaaiuien

Bij wisselende opkomst moet ieder moment benut worden voor de onkruidbestrijding. In het kramstadium kan onder droge, afgeharde omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden, bijvoorbeeld:

- 0,15 - 0,3 l/ha Emblem Flo + 0,12 l/ha Starane Top

Emblem Flo kan ook vervangen worden door Bromotril.

In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met de volgende combinatie:

- 0,25 - 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC (+ 0,2 l/ha AZ 500)

Als er geen Chloor IPC gespoten kan worden, kan deze vervangen worden door 0,25 kg/ha Pyramin. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Wintergerst

Voer de tweede remming uit met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de 1^e ziektebestrijding: 0,6 l/ha Ascrä + 0,7 l/ha Alternil.

Wintertarwe

De tweede halmverkorting kan uitgevoerd worden met:

- 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe of
- 1,0 l/ha CeCeCe of
- 0,4 l/ha Prodax + 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe

Aan deze bespuiting kan de T1-ziektebestrijding worden toegevoegd:

- 1,2 l/ha Soleil
- 1,5 l/ha Osiris

Onkruidbestrijding grasland

Na de droge zomer van 2019 staat in vele percelen grasland veel onkruid. Voer onder groeizame omstandigheden een onkruidbestrijding uit met een van de volgende combinaties:

- 1,5 - 1,9 l/ha Primstar (>1,6 l/ha = 95% driftreductie) + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4 D)
- 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran

Als zuring aanwezig is spuiten met 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir aangevuld met 0,3 l/ha Starane Top. In eerstejaars grasland kan gespoten worden met:

- 1,0 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba)

Op klaver-grasland kan gespoten worden met:

- 4,5 l/ha Butress + 1,0 - 1,5 l/ha Basagran

Onkruidbestrijding in aardappelen

Voor de adviezen in pootgoed, vroege of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt worden in Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. De adviezen zijn:

Consumptieaardappelen (Sencor-tolerant)

- 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwaluwtong, varkensgras en melden.
- 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwarte nachtschade en melden.

Consumptieaardappelen (niet-Sencor-tolerant)

- 2,5 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge; deze combinatie is sterk op zwarte nachtschade en melden.
- 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst)

Pootgoed (Sencor-tolerant)

- 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman
- 0,5 - 0,75 l/ha Sencor + 4,0 l/ha Boxer

Pootgoed (niet-Sencor-tolerant) + vroege aardappelen

- 3,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer (tot 10% opkomst)
- 2,0 l/ha Proman + 3,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen)

Enkele algemene opmerkingen:

- Spuit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond
- Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten worden. Let op dampwerking van Proman en Challenge in de buurt van bloeiende tulpen of boomgaarden.