



Onkruidbestrijding witlof / cichorei

Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):

1^e bespuiting (kiemplant):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 5 gr/ha Safari

2^e bespuiting (1^e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 10 gr/ha Safari + 40 cc/ha AZ

3^e bespuiting (2^e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 15 gr/ha Safari + 60 cc/ha AZ

4^e bespuiting (3^e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,5 - 1,0 l/ha Chloor IPC + 0,25 l/ha Trend + 15 gr/ha Safari + 100 cc/ha AZ

Vanaf het 3-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima (bij hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 l/ha Dual Gold (bij kamille, zwarte nachtschade en bingelkruid). Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om een passend advies).

In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen;

Product	Maximale dosering per keer	Maximaal aantal toepassingen	Maximale dosering per teelt	Minimal interval (dagen)
Kerb Flo	0,25 - 2,5 l/ha	5	3,75 l/ha	5
Chloor IPC	0,5 - 1,0 l/ha	12	4,0 - 6,0 l/ha	5
Dual Gold	0,1 - 0,3 l/ha	6	1,3 l/ha	5
Safari	10 - 30 gr/ha	4	60 - 120 gr/ha*	7
Frontier	0,3 - 0,45 l/ha	3/2	0,9 l/ha	7
AZ 500	0,04 - 0,2 l/ha	3	0,2 l/ha	6

*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximaal 120 gr/ha

Zaaiuien

Bij voldoende vocht de komende dagen kunnen bodemherbiciden worden aangevuld:

- 0,25 - 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of
- 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500

Houdt bij de dosering van Stomp rekening dat er wellicht nog zaden moeten kiemen.

Wintergerst

In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:

- 1,1 l/ha Ascra bij een enkelvoudige toepassing. (Vraag uw adviseur voor een passend advies).

Suikerbieten

Bij het schrale weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden te bestrijden. Ter versterking op moeilijke onkruiden zoals herik, varkensgras, kleeftkruid, ereprijs kunt u 15 gr/ha Safari toevoegen en bij kamille, hondspeterselie de dosering Safari verhogen naar 30 gr/ha. Als varkensgras, zwaluwtong, kamille, hondspeterselie of aardappelopslag in het perceel voorkomen 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel toevoegen aan het LDS. Tegen grasachtigen, duivekervel, zwarte nachtschade, kamille, zwaluwtong en tegen nakiemers kunt u vanaf het 4-bladstadium 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima toevoegen.

Bruine bonen

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen.

Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 - 0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen.

Aardappelketen adviseert telers over reinigen bewaarschuren van chloorprofam

Telers dienen alle bewaarschuren met een 'chloorprofam-verleden' te reinigen voordat ze de oogst van 2020 inschuren. Op de website van Van Overloop vindt u diverse handleidingen en checklisten om de reiniging zo goed mogelijk uit te voeren.