



Wortelonkruiden in tarwe

Bij de vroege tarwe is het vlagblad al verschenen. Tijd om in de tarwe wortelonkruiden zoals (melk-) distels, veenwortel, haagwinde, kattestaart, hoefblad en aardappelopslag te bestrijden.

Ons advies:

- 1,0 l/ha Tapir + 1,0 - 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,3 l/ha Starane Top toevoegen)
- 45 gr/ha Traton + 1,5 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)
- 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)

MCPA tot één week voor het in de aar komen toepassen; Traton SX, Starane Top en Tapir uiterlijk tot einde vlagblad gebruiken.

Ziektebestrijding in tweedejaars plantuien

Wanneer de plantuien elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding. Start tijdig met eventueel mancozeb om dan bij de tweede bespuiting op iets grotere plantuien preventief twee keer Fubol Gold of Acrobat in te zetten tegen eventueel met het plantgoed meegekomen valse meeldauw.

Advies valse meeldauw:

- 1^e bespuiting: 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane of Milcozeb) of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier.
- 2^e + 3^e bespuiting: 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier of 2,0 kg/ha Fubol Gold.
- Vervolgens: 2,5 kg/ha Mancozeb of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier.

Aandachtspunten:

- Mangaannitraat (1,0 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen.
- Later in het seizoen kunnen middelen tegen bladvlekken worden toegevoegd.

Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door Promotor (0,3 - 0,5 l/ha) toe te voegen aan een bespuiting.

Luisbestrijding in pootgoed

Virusoverdracht kunt u beperken door in pootgoed minerale olie + een pyrethroïde met repellent werking mee te spuiten met de phytophthorabespuiting en regelmatig een luisdoder in te zetten. Onderstaande insecticiden zijn dit jaar hiervoor beschikbaar:

	Dosering	Aantal toepassingen	Interval (dagen)	Tot.hoeveelheid per teeltcyclus	Opmerkingen
Pyrethroïden					
Karate Zeon	50 ml/ha	12	7	0,6 l/ha	
Sumiciden Super	200 ml/ha	12	7	2,4 l/ha	
Decis	200 ml/ha 400 ml/ha	3 2	7 14	0,9 l/ha 0,9 l/ha	
Luisdoders					
Calypso	150-250 ml/ha	2	7	0,5 l/ha	
Bariard	150-250 ml/ha	2	7	0,5 l/ha	
Gazelle	250 gr/ha	3	21	750 gr/ha	
Teppeki	160 gr/ha	2	21	-	Tijdens bloei alleen spuiten tussen zonsondergang en zonsopkomst
Closer	200 ml/ha	1	-	-	Na de bloei

Bieten

Door het niet inzetten van bodemmiddelen of de matige werking hiervan, zal het aantal na-opkomsttoepassingen toenemen. Hiervoor hebben we na de Betanal Maxxpro nog Powertwin beschikbaar met een dosering van 0,5 - 1,0 l/ha aangevuld met 1,0 l/ha olie. Vraag uw adviseur om passend advies.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.