



Phytophthora/Alternaria in aardappelen

In ons gebied is de laatste dagen plaatselijk veel regen gevallen. Dit kan de komende weken voor veel loofgroei, en dus onbeschermd blad, zorgen. Samen met de hoge temperatuur en de lange bladnatperioden zorgt dit voor hoge phytophthora-infectiekansen.

Ons advies:

- Hou in deze perioden met veel loofgroei de intervallen kort.
- Mocht u door omstandigheden 'uit het schema lopen', dan kunt u aan een preventief middel een curatief middel toevoegen, zoals 0,2 kg/ha Curzate Partner of 0,5 l/ha Cymbal Flow.
- Een ander sterk middel in de snelle loofgroeifase is Zorvec Enicade in combinatie met Trimanoc of Gachinko. Door de systemische werking van Zorvec kan het interval met 3-4 dagen worden verlengd.
- Bij zichtbare infecties moet direct een stop-bespuiting uitgevoerd worden met 2,0 l/ha Proxanil samen met een preventief middel. Deze bespuiting dient dan binnen 5 dagen herhaald te worden.

Binnen het gebied staan ook aardappels waar de middelen uit het 1^e blok al opgebruikt zijn of waar al gekozen moet worden uit middelen met knolbescherming- en/of alternaria-werking. In dit middenblok kan gekozen worden uit de volgende mogelijke combinaties:

- 1,2 - 1,6 l/ha Infinito (Infinito max. 5x toepassen, max. 6,4 l/ha, interval 7 dagen)
- 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Mancozeb (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Mancozeb max. 8x toepassen, interval 7 dagen).
- 0,3 l/ha Canvas + 1,75 kg/ha Profilux (Canvas max. 6x toepassen, interval 7 dagen; Profilux max. 6x toepassen, interval 7 dagen)
- 2,0 kg/ha Valbon (Valbon max. 6x toepassen, interval 7 dagen)

Voeg vanaf einde bloei bij de phytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. Start met twee keer 0,5 l/ha Narita en spuit vervolgens twee keer 0,2 l/ha Signum. Zowel Narita als Signum mogen vier keer worden toegepast. Signum heeft nog een nevenwerking tegen sclerotinia.

Plantuien/zaaiuien

Voor al plantuien, maar ook voor vroege zaaiuien geldt dat bij lange dauwnat-perioden en de hoge temperaturen de infectiekansen van valse meeldauw hoog zijn. Bescherm uw gewas tijdig en spuit met één van de onderstaande middelen:

- 2,5 kg/ha Acrobat
- 2,0 kg/ha Fubol Gold
- 2,0 kg/ha Valbon
- 2,5 kg/ha Dithane of Milcozeb

Voeg 0,5 l/ha Promotor toe als uitvloeier/hechter

Bruine bonen

De laat gezaaide bonen staan of komen net boven. Controleer vanaf opkomst uw gewas goed op onkruid en voer, indien nodig een bespuiting uit. Er kan op grijze grond gestart worden met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 5 à 7 dagen herhalen. Vanaf stadium 1^e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha Corum + uitvloeier.

Graszaad

Bij de huidige vochtige omstandigheden ligt zwarte roest op de loer. Controleer uw gewas goed en spuit indien nog niet gebeurt met 1,0 l/ha Prosaro.

Nieuwe toelatingen

Onlangs is de nieuwe kiemremmer Argos toegelaten in de consumptie- en zetmeelaardappelen. Argos is een kiemremmer op basis van sinaasappelolie. Door de natuurlijke oorsprong van Argos hebben de aardappelen na behandeling geen residu en is er ook geen veiligheids termijn. Argos heeft 9 toepassingen van 100 ml/ton.