



Kiemremming in consumptieaardappelen

Het moment van toepassen van MH in vroege bewaaraardappelen (bijv. Innovator) zal binnenkort aan de orde zijn. Vanwege het wegvallen van de werkzame stof chloorprofam kan met de MH-bespuiting een goede basis worden gelegd voor succesvolle bewaring. De toepassing van MH op het gewas vermindert en vertraagt het kiemproces van aardappelen tijdens de bewaring, waardoor het rendement toeneemt. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.

Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een belangrijk deel het eindresultaat in de bewaring bepaalt, staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste inzetmoment van MH:

- Spuitmoment: 3 - 5 weken voor verwachte loofddoding of afsterven van het gewas in verband met voldoende opname in de knol.
- Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei - begin afrijping. Controleer de knolgrootte: 80% minimaal 30 mm doorsnee.
- Spuit op een droog gewas bij groeiende omstandigheden. Dauwnat na de bespuiting is geen probleem. Bij warm weer in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het spuiten.
- MH altijd apart verspuiten met 300 - 500 l/ha water.
- Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.

Advies aardappelen:

- Crown MH: 11 l/ha of
- Royal MH60: 5,0 kg/ha

Ziektebestrijding consumptieaardappelen

Bij het huidige wisselvallig weer en soms harde wind is het niet altijd mogelijk de phytophthora-bespuiting op tijd uit te voeren. Om de phytophthora-bespuiting te versterken kan een van onderstaande middelen worden toegevoegd:

Middel	Dosering	Max. aantal toepassingen	Minimum interval
Curzate Partner	0,2 kg/ha	6x	5 dagen
Cymbal Flow	0,5 l/ha	6x	5 dagen
Proxanil	2,0 l/ha	6x	7 dagen

Bij een zichtbare phytophthora-aantasting altijd 2 l/ha Proxanil + een preventief middel (bijv. Ranman Top) toepassen.

Voeg vanaf einde bloei bij de phytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. Start met twee keer 0,5 l/ha Narita en spuit vervolgens twee keer 0,2 l/ha Signum. In de tussenweken kan, als er geen mancozeb-bevattend middel wordt gespoten, 1 kg/ha Dithane worden toegevoegd aan de phytophthora-bespuiting om resistentie tegen alternaria te voorkomen.

Ziektebestrijding uien

Ook de ziektebestrijding tegen valse meeldauw vraagt nu ook alle aandacht: na de huidige regen en de hogere temperaturen van volgende week nemen de infectiekansen van valse meeldauw, bladvlekken en koprot toe. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Trips in uien

In de meeste percelen heeft inmiddels een bespuiting met Batavia plaatsgevonden. De werkingsduur van Batavia is 2 - 3 weken. Herhaal deze bespuiting tijdig om tripsschade door de larven voor te blijven. Bij aanwezigheid van veel trips kan ook Tracer worden ingezet. Ons advies:

- 0,75 l/ha Batavia + 1,0 - 2,0 l/ha Olie
- 0,2 l/ha Tracer + 3,0 l/ha Biosweet