



MH-bespuiting uien

De toepassing van MH is binnenkort weer aan de orde. Het juiste moment van toepassen en de omstandigheden tijdens toepassen bepalen voor een groot gedeelte het resultaat van de spruitremming. Lees onderstaande adviezen en vraag uw adviseur om een passend advies.

Het juiste moment voor de MH-bespuiting in uien:

Voor een goed resultaat is het belangrijk MH op het juiste moment toe te passen in een gewas met een regelmatige stand en afrijping. Spuit wanneer het gewas begint te strijken (maximaal 10-15%). Het loof neemt het middel dan goed op. Te vroeg spuiten (te weinig bladloze rokken) geeft losse rokken of holle uien, te laat spuiten kan leiden tot een verminderde opname van MH.

Omstandigheden tijdens toepassen:

Spuit op een groeiend en niet afgehard gewas. Spuit op een moment dat de RV minimaal 70% is. Na de bespuiting moet het minimaal 10 uur droog zijn.

Ons advies:

- 8,3 l/ha Crown MH + uitvloeier of
- 3,75 kg/ha Royal MH 60 + uitvloeier
- Spuit met 350 - 400 liter water per hectare met een fijne druppel voor een goede bladbedekking
- MH apart verspuiten onder groeizame omstandigheden
- Bij warme omstandigheden de bespuiting liefst 's avonds uitvoeren
- MH + uitvloeier niet mengen met andere middelen; wel kan eventueel een pyrethroïde tegen trips worden toegevoegd.

Het gewas moet na de bespuiting zeker 14 dagen groen en gezond blijven voor een volledige opname van de MH in de ui.

Trips in uien

De tripsdruk in uien is over het algemeen onder controle: het aantal larven is momenteel laag, maar het aantal volwassen trips neemt iets toe. Blijf uw gewas goed controleren op trips en hou de invlucht van akkertrips van naburige percelen goed in de gaten. Probeer de tripsdruk zo laag mogelijk te houden om later nog een goede MH-opname te hebben. Voor het bestrijden van larven en volwassen trips kan één van de volgende middelen worden ingezet:

- 0,2 l/ha Tracer + 0,25 l/ha Vivolt (+ 3,0 l/ha Biosweet)
- 0,75 l/ha Benevia + 1 - 2 l/ha Olie
- Een pyrethroïde zoals Karate Zeon (50 cc/ha), Decis (0,3 l/ha) of Sumicidin Super (0,2 l/ha). Voeg aan een pyrethroïde een uitvloeier toe voor een betere indringing.

Spuit met voldoende water en een middelgrove druppel voor voldoende indringing. Een pyrethroïde-bespuiting kan ook aan de MH-bespuiting worden toegevoegd.

Groenbemesters

Nu de oogst op gang gekomen is, kunnen de groenbemesters ook gezaaid worden, zodat later in het seizoen weer op tijd geploegd kan worden. Groenbemesters zorgen voor aanvoer van organische stof, structuurverbetering en bestrijden aaltjes, kortom: een goede basis voor de nieuwe oogst. Tevens voldoet u hiermee aan de vergroeningseisen van het GLB.

Voor het GLB hebben we diverse kant-en-klare mengsels op voorraad liggen om aan de vergroeningseis te voldoen. Daarnaast hebben we ook enkelvoudige groenbemesters, zoals bladrammenas, gele mosterd, Engels en Italiaans raaigras en Japanse haver op voorraad liggen. Vraag uw adviseur om mogelijkheden.

Ziektebestrijding cichorei

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. De bladziekten die in cichorei kunnen voorkomen zijn echte meeldauw, bruine roest, alternaria en stemphylium. De volgende middelen zijn hiervoor toegelaten:

Middel	Dosering	Aantal Toepassingen	Interval (dagen)	Veiligheidstermijn (dagen)
Flint	0,25 kg/ha	2	21	21
Signum	1,5 kg/ha	2	14	14
Amistar Top	1,0 l/ha	2	21	30

