



Toevoegen ATS aan Urean

Als men zwavel wil toevoegen aan de Urean-bemesting kan dit in de vorm van ATS. Zwavel speelt een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de stikstofwerking in de plant. ATS is vloeibaar en bevat 12% N en 65% SO₃. Het advies is om ongeveer 10% ATS aan de Urean toe te voegen.

Toevoeging Limus aan Urean

De ureaseremmer Limus CL maakt ureum-houdende meststoffen net zo effectief als de vertrouwde KAS. Dankzij de vertraagde omzetting van ureum naar ammonium, komt de stikstof gedoseerd vrij en treedt er minder vervluchtiging op. Limus CL is zeer eenvoudig in gebruik. U voegt het toe aan de meststof in de tank van de veldspuit. De adviesdosering is 1 liter Limus CL per 1.000 liter Urean.

Fosfaat startmeststoffen

Voor een snelle begin-(wortel-)ontwikkeling kan er in diverse gewassen tijdens het zaaien of poten een startfosfaat worden toegepast. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat vanuit de grond (bijv. koud en nat voorjaar) zorgt een fosfaat-startmeststof voor direct beschikbare fosfaat. Wij kunnen de volgende fosfaatmeststoffen leveren:

Formulering	Product	Hoeveelheid/advies	Opmerkingen
vloeibaar	P-Focus	Zaaiuien: 30-50 l/ha Aardappelen: 50-80 l/ha	De meststoffen zijn mengbaar met Allstar en Amistar: eerst water vullen, daarna de gewasbeschermingsmiddelen toevoegen en als laatste de meststof.
	P-Start	Zaaiuien: 30-50 l/ha Aardappelen: 50-80 l/ha	
	Fertiphos*	Zaaiuien: 30-50 l/ha Aardappelen: 50-80 l/ha	
granulaat	Humostart	Plantuien/ aardappelen: 30 kg/ha	Bevat humuszuren

*Van Fertiphos zijn diverse varianten beschikbaar. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Knolbehandeling pootgoed

Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt.

Product	Toelating in pootgoed/ consumptie	Dosering per ton	Rhizoctonia	Zilver-schurft	Zwarte Spikkel	Fusarium	Phoma
Monarch	Beide	0,2 ltr	+++	+(+)			
Maxim	Consumptie	0,25 ltr	+++	+++	+		
Symphonie	Consumptie	1,5 kg	+++	+(+)			
Emesto Prime	Beide	1,0 kg	+++	+			+
Emesto Silver	Beide	0,2 ltr	+++	+++	+	++	++

Behandelend pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend!

Vydate/Nemathorin 10G

Tegen aardappelcystenaaltje en vrijlevend aaltje kan tijdens het poten Vydate 10G worden toegediend. De dosering is:

- 10 kg/ha Vydate in de rij of 20 kg/ha volvelds.

Vydate heeft tevens een goede luizenwerking, maar een matige werking op ritnaalden. Als ritnaalden het probleem is:

- 7,5 kg/ha Nemathorin 10G in de rij of volvelds 20 kg/ha (bij ritnaalden) en 30 kg/ha volvelds (bij aaltjes).

De werking van Nemathorin op aaltjes en luizen is minder dan de Vydate. Nemathorin heeft een wachttijd van 120 dagen en kan dus niet in vroege teelten. In deze vroege teelten kan tegen ritnaalden 16 kg/ha Force Evo in de rij worden gebruikt.