



Onkruidbestrijding tarwe

Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,2 kg Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Cossack Star + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1,0 l/ha Olie

De olie dient een veresterde plantaardige olie te zijn: bijv. Tipo. Deze middelen kunnen het best gespoten worden bij groeizaam weer met een hoge RV.

Onkruidbestrijding bieten

Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide. Standaard advies:

- 2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 - 100 ml/ha Centium bij aanwezigheid van hondspeterselie, bingelkruid of varkensgras.
- 3,0 l/ha Kezuro/Goltix Queen bij aanwezigheid van hondspeterselie, bingelkruid, kleeftkruid of melde.

Vrijstelling Batavia en Closer in bieten

Er is een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van deze middelen tegen bladluizen bieten. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april tot en met 15 juli. Batavia mag 2x worden toegepast met een adviesdosering van 0,45 l/ha en een interval van 14 dagen. Batavia werkt dubbel systemisch en wordt zodoende naar boven en beneden door de hele plant getransporteerd. Batavia kan prima aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd. Closer mag 1x worden toegepast in een dosering van 0,2 l/ha. Closer heeft een snelle knockdownwerking en een lange duurwerking.

Groeiregulatie wintergerst

De groeiregulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax. Het advies is:

- 0,8 l/ha Trimaxx
- 0,75 kg/ha Prodax bij 1^e knoop en 0,4 kg/ha Prodax bij 2^e knoop

Voeg hier 1-2 l/ha Mangaannittraat aan toe.

Ziektebestrijding/groeiregulatie wintertarwe

Vroeg gezaaide tarwe en vroege rassen zijn binnenkort aan de eerste groeiregulatie (T0) toe. Deze bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd:

- 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe + 0,25 l/ha Trimaxx of
- 1,0 l/ha CeCeCe of
- 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe

Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd:

- 1,0 - 1,5 l/ha Ampere (hoogste dosering bij aanwezigheid van roest)

Onkruidbestrijding vroege wortelen

Ons advies: spuit 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Challenge. De laagste dosering van Centium geldt voor lichte gronden.

Bonalan in diverse gewassen

Vooraf aan de zaaibereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof of cichorei de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek.

Onkruidbestrijding vlas

Spuit direct na zaai 0,75 - 1,0 l/ha Callisto (let op : Callisto is KUG-uitbreiding! Het toepassen hiervan is op eigen risico).