



Onkruidbestrijding cichorei/witlof

Brandt voor de grondbewerking het perceel eerst af met 2,5 - 3 l/ha Roundup Ultimate voor een schone start. Voor of tijdens de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Spuit direct na zaai:

- 2,5 l/ha Kerb Flo

Plantuinen

Vanaf opkomst, onder afgeharde omstandigheden, kan met contactmiddelen gespoten worden met:

- 0,5 l/ha Basagran + 0,25 kg/ha Lentagran + 0,50 l/ha Emblem

Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met:

- 1,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Wing P of
- 1,0 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold

Vraag uw adviseur voor een passend advies.

Zaaiuien

De eerst gezaaide uien staan/komen boven. Probeer tijdig af te branden met Roundup Ultimate en voeg hier eventueel Stomp aan toe.

Tot maximaal 10% opkomst kan op grijze grond nog worden afgebrand met:

- 0,5 l/ha Bromotril / Emblem Flo

In het kramstadium kan op grijze grond gespoten worden met:

- 0,15 - 0,2 l/ha Bromotril

Op vochtige grond kunnen in het kramstadium bodemherbiciden worden aangevuld met:

- 0,2 l/ha AZ500 aangevuld met 0,5 l/ha Stomp of 0,5 - 1,0 l/ha Wing P.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Indien men die bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Goltix (Queen), Kezuro en/of Centium, heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:

- 0,5 l/ha Goltix + 0,5 l/ha Powertwin + 0,5 l/ha Olie of
- 0,5 l/ha BOGT

Afhankelijk van de grootte van de bieten en onkruiden kunnen bovenstaande doseringen verhoogd worden. Aan de mix kan verder nog 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel of 100 - 200 gr/ha Safari DuoActive worden toegevoegd.

Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de volgende middelen gespoten worden:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	Dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Batavia	2	14 dagen	0,45 l/ha + 1 l/ha olie
Closer	1	-	0,2 l/ha

(Poot)aardappelen

Om aantasting vanuit de grond van rhizoctonia tegen te gaan, kan tijdens het poten gebruik gemaakt worden van:

- 3,0 l/ha Amistar
- 0,8 l/ha Allstar

Aan deze bespuiting kan eventueel ook een vloeibare fosfaat worden toegediend (zie nieuwsbrief 2 van 22 februari 2021)