



Wintergerst

In wintergerst worden de eerste aren binnenkort zichtbaar. Bij het verschijnen van de eerste aren kan de tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:

- 1,25 l/ha Balaya bij een enkelvoudige toepassing.

Bruine bonen

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen. Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 - 0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen.

Vlas

Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid:

- 2,5 l/ha Basagran + 0,25 - 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is mogelijk)
- 60 ml/ha Hussar + 0,25 - 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai niet mogelijk)

De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden met 1,0 l/ha Lontrel zonder olie.

Onkruidbestrijding zomergranen

Zowel in zomertarwe als in zomergerst kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande combinaties:

- 1,0 - 1,5 l/ha Primstar + 1,5 - 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of
- 0,4 - 0,6 l/ha Starane Top + 30 - 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA

Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker of haagwinde en cichorei- of witlofopslag kan 1,0 - 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir + 0,5 l/ha Primstar.

Alleen in zomertarwe kan ook duist en windhalm bestreden worden met:

- 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
- 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie

In zowel zomergerst als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen bestrijden met 1,2 l/ha Axial 50 of met 1,0 - 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 l/ha Olie. Gebruik de hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen.

Suikerbieten

Bij het schrale weer en soms zeer koude weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden aan te pakken. Ter *versterking* op moeilijke onkruiden kunt u vanaf het 2e echte bladeren de mix versterken met:

- 100 - 150 gr/ha Safari DuoActive (= Safari + Lenacil), 3 toepassingen, meerwaarde op uitstaande melde, melganzevoet, duivekervel, varkensgras, zwaluwtong, bingelkruid, hondspeterselie, kamille en kleefkruid.
- 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel, 3 toepassingen, meerwaarde op perzikkruid, zwarte nachtschade, hondspeterselie en aardappelopslag.
- 0,3 - 0,6 l/ha Tanaris (= Frontier + quinmerac), 3 toepassingen, meerwaarde op kamille, duivekervel, hondspeterselie, uitstaande melde, melganzevoet, zwarte nachtschade en kleefkruid.

Vanaf 4-bladstadium kan de mix tegen nakiemers aangevuld worden met 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Roest in Engels Raai

Tegen de bestrijding van zwarte roest in Engels Raai heeft Amistar een tijdelijke vrijstelling gekregen. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 mei tot 28 augustus. In deze periode mag Amistar 2 maal gespoten worden met een dosering van 1 l/ha. De veiligheidsstermijn van Amistar is 35 dagen en dient op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gespoten te worden met een DRT 90%. Daarnaast heeft Prosaro ook nog een toelating tegen zwarte roest in Engels Raai.