



Wortelonkruiden in tarwe

Binnenkort is het weer tijd om in de tarwe de wortelonkruiden zoals melk-/akkerdistel, veenwortel, haagwinde, kattenstaart, hoefblad en aardappelopsag te bestrijden:

Ons advies:

- 1,0 l/ha Tapir + 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,3 l/ha Starane Top toevoegen)
- 45 gr/ha Traton + 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)
- 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)

MCPA tot één week voor het in de aar komen toepassen; Traton SX, Starane Top en Tapir uiterlijk tot einde vlagblad gebruiken.

Ziektebestrijding in tweedejaars plantuien

Wanneer de plantuien elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding. Start tijdig met eventueel mancozeb om dan bij de tweede bespuiting op iets grotere plantuien preventief twee keer Fubol Gold of Acrobat in te zetten tegen eventueel met het plantgoed meegekomen valse meeldauw.

Advies valse meeldauw:

- 1^e bespuiting: 2,5 kg/ha Mancozeb (Dithane of Milcozeb) of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier.
- 2^e + 3^e bespuiting: 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier of 2,0 kg/ha Fubol Gold.
- Vervolgens: 2,5 kg/ha Mancozeb of 2,5 kg/ha Acrobat met uitvloeier.

Aandachtspunten:

- Mangaannitraat (1,0 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen.
- Later in het seizoen kunnen middelen tegen bladvlekken worden toegevoegd.

Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door Promotor (0,3 - 0,5 l/ha) toe te voegen aan een bespuiting. Bij aanwezigheid van trips kan een bespuiting met 0,75 l/ha Batavia + 1 - 2 l/ha olie worden uitgevoerd.

Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen

In zomertarwe kan tussen het stadium einde uitstoeling en de eerste knoop een halmverkorting uitgevoerd worden met 1,0 l/ha CeCeCe of met 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 l/ha CeCeCe. Komt er op het moment van spuiten gele roest of een andere aantasting voor, dan kunt u 1,2 l/ha Soleil toevoegen aan de bespuiting. Op lichte gronden kan ook nog Mangaan toegevoegd worden.

In *zomergerst* kan op het 1^e knoopstadium geremd worden met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx. Hieraan kan tegen o.a. Ramularia, netvlekkenziekte en dwergroest 0,8 l/ha Ascra Xpro worden toegevoegd. Ook hieraan kan mangaan toegevoegd worden.

Bladluizen in bieten

Momenteel is de bladluisdruk nog laag, maar bij hogere temperaturen kan dit snel veranderen. Voeg tijdig een insecticide toe aan de onkruidbestrijding zoals:

- 0,45 l/ha Batavia
- 0,2 l/ha Closer
- 140 gr/ha Teppeki
- 0,4 kg/ha Pirimor

Onkruidbestrijding aardappelen

Door de trage groei van de aardappelen kan er voor opkomst al onkruid op de aardappelruggen aanwezig zijn. Deze onkruiden kunnen bestreden worden met:

- Net voor opkomst met 0,4 l/ha Quickdown + 1,0 l/ha Olie of
- Net voor het lichten met 0,25 l/ha Sencor + 1,0 l/ha Olie.

Na opkomst kunnen onkruiden nog bestreden worden met o.a. Sencor, Citation, Basagran en Titus.