



Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting)

Bij de vroeggezaaide tarwe komt het vlagblad nu tevoorschijn. Kijk niet naar de lengte van de tarwe, maar naar het stadium “vlagblad volledig uit” (T2) en het tijdstip van de vorige bespuiting. De werkingsduur van de eerste fungicidebespuiting (T1) bedraagt bij gebruik van de volle dosering maximaal 3 à 4 weken. Middelen met een lange werkingsduur:

- 1,0 + 1,0 l/ha Priaxor Duo: dit is de opvolger van Ceriax en bevat de nieuwe werkzame stof revysol. Het middel is goed op roesten en septoria, heeft een snelle aanvangswerking en een lange duurwerking.
- 1,1 l/ha Ascra Xpro

Bij aanwezigheid van graanhaantje en/of bladluizen:

- 0,05 l/ha Karate Zeon
- 200 cc/ha Sumicidin Super
- 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje)
- 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel)

Overbemesting tarwe

Wanneer nog onvoldoende N is aangewend, of er voldoende N in de mest aanwezig was, kan het tekort aan stikstof aangevuld worden met vloeibare bladmeststoffen. Ons advies is:

Wanneer het vlagblad uit is kunt u spuiten met:

- 20 - 30 l/ha Efficie-N-t 28 (7 - 10,5 kg N) of
- 50 l/ha Next N18MgS (11 kg N)

Efficie-N-t 28 bevat alleen stikstof in de vorm van ureum, terwijl Next N18MgS naast amidestikstof bestaat uit zwavel en magnesium. Toepassing van de bladmeststoffen:

- Spuit met maximaal 200 liter spuitvloeistof
- Spuit op een droog gewas met een fijne druppel

Next N18MgS is niet mengbaar met fungiciden in verband met verbranding.

Onkruidbestrijding maïs

Onkruidbestrijding in maïs bestaat meestal uit een mix van middelen met een contact-, bodem- en grassenwerking. Onderstaande mixen kunnen toegepast worden:

- 0,75 l/ha Nagano + 2,0 l/ha Gardo Gold (Gardo Gold mag niet op zandgronden)
- 1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold
- 1,5 l/ha Calaris + 1,0 l/ha Frontier Optima
- 2,25 l/ha Laudis + 2,0 l/ha Gardo Gold (bij glad vingergras (vroeg spuiten))

Aan deze mixen kunnen nog de volgende middelen worden toegevoegd:

- 0,2 - 0,3 kg/ha Casper bij grote kamille en haagwinde
- 20 gr/ha Peak bij grote kamille
- 0,5 - 0,7 l/ha Kart bij kleine kamille en haagwinde
- 1,0 l/ha Lontrel bij akker- of melkdistel
- 1,0 l/ha Milagro 40 bij bovenstaande grassen.

Luisbestrijding in pootgoed

Om besmetting met non-persistente virussen tegen te gaan is het advies om vanaf opkomst met minerale olie met een pyrethroïde te spuiten. Start zodra 30% van de aardappelen boven staan en houd korte intervallen aan zodat alle nieuw gevormd blad steeds bedekt is. Toevoeging van een pyrethroïde zorgt voor luisdoding en tevens voor een repellent-werking van bladluizen. Vanwege de mindere gevoeligheid van luizen voor een pyrethroïde is het belangrijk om regelmatig een luisdoder in te zetten.

Middel	Dosering	Max. aant. toepassingen	Max. kg/l per hectare	Interval	Opmerkingen
Closer/Sequoia	0,2 l/ha	1x per 12 mnd	0,2 l/ha	-	Na de bloei
Gazelle/Antilop	0,25 kg/ha	3x per teelt	0,75 kg/ha	21 dagen	Vanaf 50% bodembedekking
Batavia	0,75 l/ha	4x per teelt	-	7 dagen	Na de bloei
Pirimor	0,5 kg/ha	2x per teelt	-	10 dagen	
Decis	0,2 l/ha	3x per teelt	0,9 l/ha	7 dagen	
Sumicidin Super	0,2 l/ha	12x per teelt	2,4 l/ha	7 dagen	
Karate	0,05 l/ha	12x per teelt	0,6 l/ha	7 dagen	

