



### Suikerbieten

Controleer voor sluiten van het gewas of er nog onkruiden aanwezig zijn en voer eventueel een laatste bespuiting uit met Powertwin, aangevuld met Dual Gold (max. 1,5 l/ha) of Frontier Optima (max. 0,9 l/ha). Melk- en/of akkerdistel en klein hoefblad kunnen in een aparte bespuiting worden bestreden met 1,2 l/ha Lontrel + 1,0 l/ha Olie. Controleer ook of er luizen aanwezig zijn en voeg, indien nodig, een insecticide toe aan de onkruidbestrijding.

### Bruine bonen

Na opkomst kunt u starten met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen herhalen. Vanaf stadium 1<sup>e</sup> drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha Corum + uitvloeier.

### Vogelafweer

Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen. De mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door de wind aangedreven vogelverschrikkers en vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels, of vogelafweer met geluid.

### Aardappelen

Rond 10 - 15 juni kan de aardappeltopluis het jonge aardappelgewas aanpakken, wat later in het seizoen zichtbaar wordt in de vorm van toprol. Bestrijding moet preventief gebeuren in een jong gewasstadium. Ook de Coloradokever is dit jaar al vroeg aanwezig. Maak een keuze uit één van de onderstaande middelen.

	Dosering	Aantal toepassingen	Interval (dagen)	Totale hoeveelheid per teeltcyclus	Bestrijdt luizen excl. wegedoorn- en vuilboomluis	Bestrijdt Vuilboom- en wegedoornluis	Bestrijdt Colorado-kever	Spaart natuurlijke vijanden
<b>Pyrethroïden</b>								
Karate Zeon	50 ml/ha	12	7	0,6 l/ha	Ja	Nee	Ja	Nee
Sumiciden Super	200 ml/ha	12	7	2,4 l/ha	Ja	Nee	Ja	Nee
Decis	200 ml/ha 400 ml/ha	3 2	7 14	0,9 l/ha 0,9 l/ha	Ja	Nee	Ja	Nee
<b>Luisdoders</b>								
Gazelle/ Antilop	250 gr/ha	3	21	750 gr/ha	Ja	Ja	Ja	Deels
Teppeki	160 gr/ha	2	21	-	Ja	Ja	Nee	Ja
Closer/ Sequoia	200 ml/ha	1	-	-	Ja	Ja	Nee	Ja
Pirimor	500 gr/ha	2	14	1,0 kg/ha	Ja	Nee	Nee	Ja

### Overbemesting aardappelen

Een andere optie dan KAS als stikstof-overbemesting is om vanaf de knolzetten Next N18 CaMgMn als bladbemesting een aantal keer toe te passen. Dit kan in combinatie met de phytophthora-bestrijding. Tevens wordt er Calcium, Magnesium en Mangaan toegediend.

Advies: start vanaf 'erwtjes-stadium' met 50 l/ha Next N18 CaMgMn. Advies bespuitingen:

- Spuit altijd op een droog gewas en met een fijne druppel!
- Eerste keer na knolzetting: dosering 50 l/ha, daarna herhalen om de 14 dagen (50 l/ha).
- Maximaal 200 liter vloeistof verspuiten (150 l water + 50 l Next N18 CaMgMn)

### Plantuinen/zaaiuien

Controleer uw gewas weer goed op aanwezigheid van trips. Het zijn de larven die schade in de uien veroorzaken. Batavia heeft een goede werking op de trips-larven, maar dient *preventief* te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Door de systemische werking van Batavia worden de larven van 'binnenuit' bestreden en worden de natuurlijke vijanden en trips gespaard. Ons advies: 0,75 l/ha Batavia + 1,0 - 2,0 l/ha Olie.