



VAN OVERLOOP B.V.
gewasbeschermingsmiddelen

NIEUWSBRIEF

nr. 19 30 augustus 2021

Loofdoding van consumptieaardappelen

Het doodspuiten van aardappelen is binnenkort weer aan de orde. Ons advies hiervoor is:

Spuit het gewas open met:

- 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top

Na 5-7 dagen kan er dan, indien nodig, gespoten worden met:

- 1,0 l/ha Spotlight Plus + 1,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om aan het begin van een zonnige dag te spuiten met voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het gewas.

Twee zaken verdienen extra aandacht bij de loofdoding: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging.

Door de aanwezigheid van phytophthora is het tot het eind belangrijk om de phytophthora en knolbescherming goed aan te pakken. Voeg aan de loofdoding altijd Ranman Top toe.

Onkruidbestrijding weiland

In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties:

Een brede combinatie is:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinx Pro bij eerstejaars grasland)

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinx Pro

Bij alleen zuring kan gespoten worden met:

- 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top

Ziektebestrijding bieten

Het is belangrijk om uw bietenpercelen na de eerste bespuitingen regelmatig te blijven controleren op bladvlekken. Spuit uw gewas bij nieuwe of uitgebreide aantasting of als de vorige bespuiting 3 tot maximaal 4 weken geleden is. Maak daarbij keuze uit de volgende middelen:

- 1,0 l/ha Mirador Xtra (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 35 dagen), heeft een nevenwerking tegen Stemphilium.
- 1,0 l/ha Bicanta (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 35 dagen), heeft een nevenwerking tegen Stemphilium.
- 0,35 l/ha Sphere (max. 2x per seizoen, interval 21 dagen, veiligheidstermijn 21 dagen).

Aan de bladschimmelbestrijding kan nog wel bladvoeding worden toegevoegd, zoals (vloeibare) Ureum, Mangaan en/of Magnesiumnitraat, Microtop Bitterzout of Polyfeed Duetto.

Ziektebestrijding cichorei

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. De bladziekten die in cichorei kunnen voorkomen zijn echte meeldauw, bruine roest, alternaria en stemphylium. Spuit, indien nodig, met 0,25 kg/ha Flint (interval 21 dagen, veiligheidstermijn 21 dagen).

Groenbemesters

Voor het GLB hebben we diverse kant-en-klare mengsels op voorraad liggen om aan de vergroeningseis te voldoen. Daarnaast hebben we ook enkelvoudige groenbemesters, zoals bladrammenas, gele mosterd, Engels en Italiaans raaigras en Japanse haver op voorraad liggen. Vraag uw adviseur om de mogelijkheden.

Gewasbeschermingsmonitor

U bent verplicht binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Daarin dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt en welke gewasbeschermingsmiddelen u hebt gebruikt. Indien u nog een gewasbeschermingsmonitor moet invullen dan kunt u een exemplaar vragen bij uw adviseur.