



Onkruidbestrijding Engels Raigras

Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u *direct* na zaai een bespuiting uitvoeren met 1,4 - 2,0 l/ha Trammat 500. Bij Engels raagrass wat vanonder een dekvrucht komt, kan óver het gewas ook Oblix 500 worden gespoten. Om bovenstaande onkruiden te bestrijden kan aan deze bespuiting Primus, Primstar of Tapir worden toegevoegd. Vraag uw (graszaad)adviseur om een passend advies.

Slakkenbestrijding

De slakkenbestrijding is dit jaar extra belangrijk vanwege de vele aanwezige slakken, zeker als de omstandigheden vochtig en warm zijn. Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. Iroxx is een langwerkende, traag oplossende korrel ten opzichte van Derrex.

Advies Derrex/Iroxx:

- Zaai slakkenkorrels mee met het zaaien of strooi *direct* na het zaaien als slakkenvraat wordt verwacht.
- Dosering 7 kg/ha
- Het kan noodzakelijk zijn om de behandeling te herhalen.

Wintergranen

De tijd om wintergerst te zaaien is al aangebroken en binnenkort start ook de inzaai van wintertarwe. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst, ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur. Heeft u de voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen leveren. Ook behandelde tarwe met Latitude XL is mogelijk; deze kan later niet teruggegeven worden.

Nieuw dit jaar is dat we een aantal rassen kunnen leveren met een B-UP coating. B-Up is een combinatie van twee groeistimulanten (humuszuren en fulvozuren) die samen voor een hogere opbrengst zorgen. Deze groeistimulanten verbeteren de groeiomstandigheden in de bodem, waardoor een beter vocht- en voedingsstoffen opname plaatsvindt. Verder is er een betere plantontwikkeling: betere beworteling, snellere jeugdgroei, betere uitstoeling en stay-green effect. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Onkruidbestrijding in het najaar geeft de mogelijkheid om wortelonkruiden in het voorjaar goed aan te pakken. Ons advies voor wintertarwe:

- Direct na zaai bij goede bedekking van het zaad:
 - 0,6 l/ha Herold (+ eventueel 0,2 l/ha AZ 500) of
 - 3,0 - 4,0 l/ha Malibu (+ eventueel 0,2 l/ha AZ 500). Let op: het zaad moet goed bedekt zijn!
- Na opkomst vanaf het 1-2 bladstadium:
 - 0,45 - 0,6 l/ha Herold + insecticide of
 - 2,0 l/ha Activus Super + 0,5 l/ha Fence + insecticide

Als insecticide tegen bladluizen, die het gerstevergelingsvirus kunnen overbrengen, kan worden gebruikt: 0,25 l/ha Decis (2 toepassingen), 0,05 l/ha Karate Zeon (1 toepassing) of 0,2 l/ha Sumicidin Super (2 toepassingen).

Ons advies voor wintergerst:

- 0,5 - 0,6 l/ha Herold + eventueel een insecticide. Ook als er een gerstevergelingsvirus-tolerant ras is gezaaid, is het aan te raden om bij aanwezigheid van bladluizen een bespuiting met een insecticide uit te voeren om de zuigschade te beperken.

Knaagdierbeheersing

Nu de dagen weer kouder en natter worden vraagt de bestrijding van ongedierte weer de aandacht. Voor de niet-chemische bestrijding van ratten en muizen hebben we o.a. diverse muizen- en rattenklemmen, voederbakken (waar klemmen of rodenticiden in geplaatst kunnen worden) en vangkooien.

Als deze bestrijding onvoldoende helpt kan alleen binnen gebouwen gebruik gemaakt worden van *chemische* middelen: de zogenaamde rodenticiden. Ook hiervan hebben we diverse producten op voorraad. Belangrijk hierbij is dat men zorgt dat er voldoende 'giftig lokaas' in de voederbakken aanwezig is en dat men pas stopt als er geen opname meer is van de rodenticide. Op plaatsen waar veel alternatief voedsel aanwezig is kan vaak effectiever gewerkt worden met vallen of klemmen.