



Afbranden

Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundup-bespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5 - 3,0 l/ha Roundup Ultimate of 2,5 - 4,0 l/ha Clinic N. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

Rudis in uien

Tegen grondgebonden ziekten zoals Fusarium en Wltrot kan zowel in plantuien als zaaiuien een grondbehandeling met Rudis voor het planten of zaaien worden ingezet. Deze grondbehandeling kan een behoorlijke reductie van beide aantastingen bewerkstelligen. De dosering is 0,6 l/ha Rudis, en dient voor de laatste grondbehandeling te worden toegepast.

Onkruidbestrijding plantuien

Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies:

- 2,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ500 (bij hoge meldedruk) of
- 2,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 (bij bingelkruid; duivenkervel)

Onkruidbestrijding zaaiuien

Advies: direct na zaai op vochtige grond *of* na kieming bij droge grond: 0,75 - 1,5 l/ha Stomp. Bij twee toepassingen vóór opkomst is de maximale dosering 1,0 l/ha + 0,75 l/ha.

Onkruidbestrijding graszaad

Als de grond berijdbaar is kan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd om onkruiden zoals klein kruiskruid, kamille en klimopereprijs tijdig te bestrijden. Hierbij kunnen combinaties van Primstar, Primus, Starane Top, Tapir of Fox worden ingezet. Fox 480SC heeft in Engels Raaigras weer een tijdelijke toelating van 0,65 l/ha gekregen van 1 maart t/m 30 april. Belangrijke wijziging is dat Fox nu in Engels Raaigras met DRT97,5% moet worden toegepast i.p.v. 75%. Voor andere graszaadsoorten is wel DRT75% van toepassing.

Onkruidbestrijding tarwe

Voor een goed resultaat en om opbrengstderiving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 200 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Cossack Star + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1,0 l/ha Olie.

De olie dient een veresterde plantaardige olie te zijn: bijv. Tipo-olie. Deze middelen kunnen het best gespoten worden bij groeizaam weer met een hoge RV.

Groeiregulatie wintergerst

De groeiregulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax uitgevoerd worden. Het advies is:

- 0,5 - 0,8 l/ha Trimaxx
- 0,6 - 0,75 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe bij 1e knoop en 0,4 kg/ha Prodax bij 2^e knoop.

Voeg hier 1,0 - 2,0 l/ha Mangaannitrat aan toe.

Onkruidbestrijding vlas

Spuut direct na zaai 0,75 - 1,0 l/ha Callisto + 0,3 l/ha Grounded. Let op: Callisto is een KUG-toelating: het toepassen hiervan is op eigen risico.

Nieuw spuitseizoen

Nu het nieuwe spuitseizoen voor de deur staat, is het ook tijd om uw persoonlijke veiligheids- en beschermingsproducten na te kijken. Zet nieuwe filters in uw gelaatsmasker of schaf een nieuw wegwerpmasker aan. Door deze na gebruik goed op te bergen in de afsluitbare folie of emmertje, kan die een heel spuitseizoen mee. Zorg ook voor goed beschermende handschoenen.