



Bonalan in diverse gewassen

Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men in capucijners, bruine bonen, witlof en cichorei de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Bonalan heeft een zeer goede werking tegen melde, varkensgras, zwarte nachtschade en is zeer effectief tegen grassen. Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is de toepassing van Bonalan uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een 95% driftreducerende techniek.

Onkruidbestrijding cichorei/witlof

Vooraf aan de zaaibedbereiding heeft men de mogelijkheid om 8,0 l/ha Bonalan in te werken. Spuit direct na het zaaien:

- 2,5 l/ha Kerb Flo

Onkruidbestrijding suikerbieten

Indien men de bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Goltix, Kezuro en/of Centium, heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:

- 0,5 l/ha Goltix + 0,5 - 1,0 l/ha Powertwin of Betanal Tandem + 1,0 l/ha Tipo Olie of
- 0,5 l/ha BOGT

In plaats van Goltix kan ook Goltix Queen of Kezuro in het LDS-systeem. Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de volgende middelen gespoten worden:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	Dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Batavia	2	14 dagen	0,45 l/ha
Closer	1	-	0,2 l/ha

Groei regulatie / ziektebestrijding wintergerst

Voer de tweede remming uit met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx en voeg hieraan toe de eerste ziektebestrijding: 1,25 l/ha Balaya of 0,8 l/ha Ascra.

Groei regulatie / ziektebestrijding wintertarwe

Vroeggezaaide tarwe en vroege rassen zijn ongeveer aan de eerste groei regulatie (T0) toe. Deze bespuiting kan met de volgende combinaties worden uitgevoerd:

- 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCE + 0,25 l/ha Trimaxx of
- 1,0 l/ha CeCeCe of
- 0,3 - 0,4 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe

Hieraan kan eventueel een ziektebestrijding worden toegevoegd:

- Bij aanwezigheid van gele roest: 0,75 l/ha Retengo
- Bij aanwezigheid van septoria: 1,0 - 1,5 l/ha Stavento

Plantuinen

Vanaf opkomst kan op grijze grond en afgeharde omstandigheden op bovenstaande onkruiden gespoten worden met een combinatie van Basagran, Lentagran en/of Starane Top.

Later, bij regen, kunnen bodemherbiciden aangevuld worden met:

- 1,0 l/ha Wing P of
- 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold

Vraag uw adviseur om een passend advies.

Zaaiuien

De eerste gezaaide uien komen boven. Probeer tijdig af te branden met Roundup Ultimate en voeg hier eventueel Stomp aan toe. Tot 10%-opkomst kan op grijze grond gespoten worden met Basagran en Starane Top. Vraag uw adviseur voor een passend advies.