



### Onkruidbestrijding zomergroten

Zowel in zomertarwe als in zomergroten kan het onkruid bestreden worden met de onderstaande combinaties:

- 1,0 - 1,5 l/ha Primstar + 1,5 + 2,0 l/ha MCPA (bij grasonderzaai) of
- 0,4 - 0,6 l/ha Starane Top + 30 - 45 gr/ha Traton SX + 2,0 l/ha MCPA

Bij aanwezigheid van akker- en melkdistel, hoefblad, veenwortel, akker- of haagwinde en cichorei- of witlofopslag kan 1,0 - 1,5 l/ha Primstar vervangen worden door 1,0 l/ha Tapir + 0,5 l/ha Primstar.

Als ook duist en windhalm bestreden moeten worden, kan alleen in zomertarwe:

- 130 gr/ha Capri Twin + 0,3 l/ha Starane Top + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie
- 130 gr/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Primstar + 1,0 l/ha MCPA + 1,0 l/ha Olie

In zowel zomergroten als zomertarwe kunt u diverse grassen zoals duist, windhalm en raaigrassen bestrijden met Axial 50 (0,9 - 1,2 l/ha) of met 1,0 - 1,2 l/ha Puma Extra + 1,0 l/ha Olie. Gebruik de hoogste dosering bij bestrijding van duist en raaigrassen. Vraag uw adviseur om een passend advies.

### Onkruidbestrijding suikerbieten

Aan de LDS-besputtingen in suikerbieten (zie ook vorige nieuwsbrief) kunnen de volgende middelen worden toegevoegd om bepaalde onkruiden beter te bestrijden:

- Safari Duo Active ter versterking op varkensgras, kamille, kleefkruid, bingelkruid, perzikkruid en zwaluwtong. De dosering is 100 gr/ha, te beginnen vanaf 2 echte blaadjes. Pas op bij toepassing net voor veel regen.
- Safari bij aanwezigheid van kleefkruid, kamille, perzikkruid en varkensgras. De dosering vanaf 2 echte blaadjes is 15 gr/ha.
- Lontrel om de mix te versterken tegen varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid, kamille en hondspeterselie. De dosering hiervoor is 0,3 - 0,5 l/ha. Later kan Lontrel ook nog apart gespoten worden tegen akker(melk)distel, hoefblad, cichorei-/aardappelopslag met dosering van 1,2 l/ha + 1 l/ha olie.

N.B. De toelating van Safari en Safari Duo Active vervalt waarschijnlijk. Momenteel zijn de uitverkoop- en opgebruiktermijn van beide stoffen nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte als er wijzigingen hierin bekend zijn.

### Onkruidbestrijding in aardappelen

Voor de adviezen in pootgoed of consumptieaardappelen moet onderscheid gemaakt worden in Sencor-tolerante rassen (zie Sencor-app van Bayer) en niet-Sencor-tolerante rassen. De adviezen zijn:

Pootgoed	Sencor-tolerant	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,0 l/ha Boxer + 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Proman</li><li>• 4,0 l/ha Boxer + 0,5 - 0,75 l/ha Sencor</li></ul>
	Niet-Sencor-tolerant	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 10% opkomst)</li><li>• 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Proman + 1,0 l/ha Challenge (direct na frezen)</li></ul>
Consumptie-aardappelen	Sencor-tolerant	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,0 - 4,0 l/ha Boxer + 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 1,5 - 2,0 l/ha Challenge (zwarte nachtschade + melden)</li><li>• 3,0 - 4,0 l/ha Boxer + 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Gofor (zwarte nachtschade, melden, straatgras, hanepoot, doornappel)</li><li>• 0,2 l/ha Centium + 0,3 - 0,5 l/ha Sencor + 2,0 l/ha Challenge (sterk op varkensgras, zwaluwtong en melden)</li></ul>
	Niet-Sencor-tolerant	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,0 l/ha Boxer + 2,5 l/ha Proman + 1,0 - 1,5 l/ha Challenge.</li><li>• 3,0 l/ha Boxer + 3,0 l/ha Proman (tot 10% opkomst)</li></ul>

#### Enkele algemene opmerkingen:

- Spuit indien mogelijk op bezakte, vochtige grond.
- Centium en Challenge dienen ruim voor opkomst gespoten te worden in verband met gewasreactie. Boxer, Sencor en Proman kunnen tot bij opkomst gespoten worden.