



### Onkruidbestrijding suikerbieten

Bij het schrale weer en soms winderige weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen en het verhogen van de olie deze onkruiden aan te pakken. Ter *versterking* op moeilijke onkruiden kunt u vanaf het 2e echte bladeren de mix versterken met:

- 100 - 150 gr/ha Safari DuoActive (= Safari + Lenacil), 3 toepassingen, meerwaarde op uitstaande melde, melganzevoet, duivekervel, varkensgras, zwaluwtong, bingelkruid, hondspeterselie, kamille en kleefkruid.
- 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel, 3 toepassingen, meerwaarde op perzikkruid, zwarte nachtschade, hondspeterselie en aardappelopslag.
- 0,3 - 0,6 l/ha Tanaris (= Frontier + quinmerac), 3 toepassingen, meerwaarde op kamille, duivekervel, hondspeterselie, uitstaande melde, melganzevoet, zwarte nachtschade en kleefkruid.

Vanaf 4-bladstadium kan de mix tegen nakiemers aangevuld worden met 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima. Vraag uw adviseur om een passend advies.

### Bladluizen in suikerbieten

Momenteel zijn de eerste groene perzikbladluizen als zwarte bonenluizen gesignaleerd in de bieten. De groene perzikbladluis kan het vergelingsvirus overbrengen en heeft in dit vroege stadium van de bieten een lage bestrijdingsdrempel, namelijk 2 groene luizen per 10 planten. De zwarte bonenluis, die alleen zuigschade veroorzaakt, heeft een hogere bestrijdingsdrempel: 50 % van de planten bezet met kolonies van zwarte luizen. De volgende luizenmiddelen, die aan de onkruidbestrijding kunnen worden toegevoegd, zijn momenteel toegelaten:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Batavia	2	14 dagen	0,45 l/ha
Closer	1	-	0,2 l/ha

### Onkruidbestrijding vlas

Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid:

- 2,5 l/ha Basagran + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is mogelijk)
- 60 ml/ha Hussar + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai *niet* mogelijk)

De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden met 1,0 l/ha Lontrel zonder olie.

### Bruine bonen

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen. Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 - 0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel Roundup Ultimate toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen.

### Wintergerst

In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:

- 1,1 l/ha Ascra of
- 1,25 l/ha Balaya (sterk op ramularia)

### Nieuwe toelatingen/wijzigingen middelen

- Amistar heeft in 2022 weer een tijdelijke vrijstelling gekregen in Engels Raai zaadteelt tegen zwarte roest. De vrijstelling loopt van 1 mei tot 28 augustus.
- Challenge heeft een uitbreiding in 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> jaars plantuien.