



Onkruidbestrijding mais

Onkruidbestrijding in maïs bestaat meestal uit een mix van middelen met een contact-, bodem- en grassenwerking. Onderstaande mixen kunnen toegepast worden:

- 1,0 l/ha Callisto + 2,0 l/ha Gardo Gold (Gardo Gold mag niet op zandgronden)
- 0,5 l/ha Calaris + 0,75 l/ha Callisto + 1,0 l/ha Frontier Optima
- 2,25 l/ha Laudis + 2,0 l/ha Gardo Gold (bij glad vingergras (vroeg spuiten))

Aan bovenstaande mixen kunnen nog de volgende middelen worden toegevoegd:

- 0,2 - 0,3 kg/ha Casper bij grote kamille en haagwinde
- 20 gr/ha Peak bij grote kamille
- 0,5 - 0,7 l/ha Kart bij kleine kamille en haagwinde
- 1,0 l/ha Lontrel bij akker- of melkdistel
- 1,0 l/ha Milagro 40 bij bovenstaande grassen.

Een andere brede combinatie is:

- 1,75 l/ha Laudis + 0,75 l/ha Monsoon Active + 0,5 l/ha Calaris + 1 l/ha Frontier Optima

Grassenbestrijding diverse gewassen

Als straatgras en/of andere grassen bestreden moeten worden, kan er een bespuiting uitgevoerd worden met Centurion Plus.

Advies Centurion Plus:

- Bestrijding van 1-jarige grassen en klein straatgras: 1,0 l/ha Centurion Plus
- Bestrijding van ontwikkeld straatgras (tot einde uitstoeling): 2,0 l/ha Centurion Plus
- Bestrijding van kweek: 2,5 l/ha Centurion Plus

Als er geen straatgras aanwezig is, kan er ook gespoten worden met Focus Plus of Fusilade Max.

Trips in plantuien

De eerste larven van trips zijn al weer waargenomen in plantuien. Door de zachte winter en de hoge temperatuur hebben we al vroeg te maken met trips. Batavia heeft een goede werking op de trips-larven, maar dient *preventief* te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Controleer uw gewas goed en voer tijdig een bespuiting uit.

Ons advies:

- 0,75 l/ha Batavia + 2,0 l/ha Tipo

Gebruik hiervoor voldoende water.

Onkruidbestrijding zaaiuien

Nu het weer geregend heeft, kunnen er op vochtige grond bodemmiddelen worden aangevuld. Afhankelijk wat er al is toegepast en de eventueel nog toe te passen contactherbiciden kunnen Boxer, Wing P en Dual Gold worden aangevuld. Vraag uw adviseur om een passend advies.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Na de regen kunnen aan de onkruidbestrijding nog extra bodemmiddelen worden toegevoegd:

- 0,75 l/ha Dual Gold
- 0,45-0,60 l/ha Frontier
- 0,6 l/ha Tanaris

Suikerbieten en borium

Een tekort aan Borium kan hartrot veroorzaken. De bieten hebben dan een grotere kans op een lagere suiker opbrengst. Boriumgebrek is te voorkomen door borium te spuiten tussen het vierbladstadium en het sluiten van het gewas. Advies: spuit 2,5 kg/ha Solubor DF of 3,0 l/ha Bortrac. Hieraan kan 1-2 l/ha mangaannittraat of 10 kg/ha Microtop Bitterzout toegevoegd worden. Ook een insecticide is hieraan toe te voegen. Solubor of Bortrac alleen kan ook aan de onkruidbestrijding worden toegevoegd.