



Phytophthora in aardappelen

De stand van de aardappelen in het gebied is wisselend: van aardappelen die nog boven moeten komen tot al een bijna sluitend gewas. Het aantal bespuitingen is dus ook zeer gevarieerd.

De eerste bespuitingen kunnen plaatsvinden met:

- 0,8 l/ha Orvego (5x) of
- 0,6 l/ha Revus (6x)

In de snelle loofgroeifase kan eventueel overgeschakeld worden op:

- 0,15 l/ha Zorvec + 0,3 l/ha Gauchinko of
- 0,4 l/ha Zorvec Endavia

In het middenblok kan gespoten worden met:

- 1,2 - 1,6 l/ha Infinito + 1 l/ha olie of
- 0,3 l/ha Canvas + 0.5 l/ha Vendetta of 0.5 l/ha Kunshi

Bij het uitlopen van het spuitschema of bij hoge phytophthoradruk kunnen bovenstaande middelen versterkt worden met:

- 0,2 kg/ha Curzate Partner of
- 0,25 kg/ha Cymbal of
- 0,5 l/ha Cymbal Flow

Overbemesting aardappelen

Een andere optie dan KAS als stikstof-overbemesting is om vanaf de knolzetting Next N18 CaMgMn als bladbemesting een aantal keer toe te passen. Dit kan in combinatie met de phytophthora-bestrijding. Tevens wordt er Calcium, Magnesium en Mangaan toegediend.

Advies: start vanaf 'erwtjes-stadium' met 50 l/ha Next N18 CaMgMn. Advies bespuitingen:

- Spuit altijd op een droog gewas en met een fijne druppel!
- Eerste keer na knolzetting: dosering 50 l/ha, daarna herhalen om de 14 dagen (50 l/ha).
- Maximaal 200 liter vloeistof verspuiten (150 l water + 50 l Next N18 CaMgMn)

Bladvoeding aardappelen

Als er geen overbemesting met stikstof nodig is, kunnen mangaan en magnesium ook apart aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoegd. U kunt hiervoor bijv. de volgende middelen toevoegen:

- 2 x 1,0 l/ha Mangaan Vlb Extra (mangaan) en 5 x 2,0-5,0 l/ha Substrafeed Magnitra (magnesium)
- Of 5 x 5,0 l/ha Powerleaf MnMg (bevat stikstof, mangaan en magnesium)
- Of 4 x 10,0 kg/ha Bitterzout Microtop (bevat magnesium, mangaan, zwavel en borium)
- Of 3 x 5 l/ha Solatrel (bevat fosfaat, kali, mangaan, magnesium en zink).

Ook Calcium en Bladkali kan aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoegd door middel van 4,0 - 5,0 l/ha Calcium Forte of 5,0 l/ha BladKali TS. Let op: deze middelen verschillen in gehalte van hoeveelheid bladvoeding. Vraag uw adviseur welk product gezien de grond, gewas en ras het beste bij u past.

Bruine bonen

Na opkomst kunt u starten met 0,5 l/ha Basagran en uitvloeier. Deze bespuiting na 6 à 7 dagen herhalen. Vanaf stadium 1^e drietallig blad kan 1 x 1,25 l/ha Corum + uitvloeier ingezet worden of 2 x 0,625 l/ha Corum + uitvloeier.

Vogelafweer

Wij kunnen verschillende artikelen leveren om ongewenste vogels af te schrikken en te verjagen. De mogelijkheden zijn heel divers: knalapparaten, laserlampen, door de wind aangedreven vogelverschrikkers en vliegers, opblaasbare vogelverschrikkers, kunststof kraaien of roofvogels, of vogelafweer met geluid.

Vooraankondiging proefvelddagen

Ook dit jaar organiseert Van Overloop BV weer proefvelddagen. Er is dit jaar een proefveld tarwe met daarin een rassenproef als ook diverse fungicidenproeven. U kunt deze proefvelden bezoeken voor een rondleiding op maandagavond 20 juni of dinsdagavond 21 juni a.s. Deze bijeenkomst kan meetellen voor de licentieverlening. Een definitieve uitnodiging en opgaveformulier volgt nog, maar u kunt deze data alvast noteren.