



Alternaria in aardappelen

Voeg vanaf einde bloei bij de phytophthora-bespuiting om de 14 dagen een middel toe tegen Alternaria. Start met 0,45 l/ha Propulse (fluopyram en prothioconazool) en spuit vervolgens twee weken later met 0,5 l/ha Narita. Propulse mag 2 keer worden toegepast en Narita mag vier keer worden toegepast.

Middel	Dosering	Aantal toepassingen	Veiligheidstermijn	Soort Alternaria
Propulse	0,45 l/ha	2	7 dagen	Altarnata/Solani
Narita	0,5 l/ha	4	14 dagen	Altarnata/Solani
Signum	0,25 kg/ha	4	geen veiligheidstermijn	Altarnata/Solani
Amistar	0,5 l/ha	3	7 dagen	Solani

Graszaad

Bij de huidige wat vochtigere omstandigheden en soms dauwnachten ligt zwarte roest op de loer. Controleer uw gewas goed en spuit indien nog niet gebeurt met 1,0 l/ha Prosaro + uitvloeier.

Ziektebestrijding in suikerbieten

Controleer vanaf sluiten gewas uw gewas goed en voer bij beginnende aantasting een bespuiting uit. Proeven hebben uitgewezen dat een tijdige bestrijding het beste rendement oplevert. Onderstaande middelen kunnen dit jaar toegepast/opgebruikt worden:

Middel	Dosering	Werkzame stof	Max. aantal toepassingen	Veiligheids- termijn
Score 250 EC/ Borgi	0,4 l/ha	difeconazool	2	28 dagen
Difure Solo	0,5 l/ha	difeconazool	2	21 dagen
Spyrale	1 l/ha	difeconazool/ fenpropidin	2	28 dagen
Bicanta	1 l/ha	difeconazool/ azoxystrobine	2	35 dagen
Sphere	0,35 l/ha	cyproconazool/ trifloxystrobine	2	21 dagen
Mirador Xtra	1 l/ha	cyproconazool/ azoxystrobine	2	35 dagen

Opmerkingen:

- Sphere en Mirador Xtra morgen niet meer verkocht worden, de opgebruikstermijn voor beide middelen is 30 - 11 - 2022.
- Wanneer het bietenperceel grenst aan oppervlaktewater geldt voor Spyrale een DRT van 95% plus 0,5 m teeltvrije- of DRT 90% plus 1 m teeltvrije zone.
- Voor stemphylium geldt dat er een nevenwerking is van Spyrale, Mirador Xtra en Bicanta
- Score en Borgi hebben geen meeldauwwerking
- Probeer de verschillende middelen zoveel mogelijk af te wisselen.
- Voeg aan de verschillende fungiciden 0,4 l/ha Promotor voor een betere opname.

Aanvullend kan men aan de fungicide een bladvoeding aan toevoegen om de bladstand gezonder te houden. Een gezond blad is minder gevoelig voor de diverse bladschimmels. Mogelijke bladvoedingen zijn:

- 10 kg/ha Microtop Bitterzout
- 1,0 l/ha Mangaannittraat
- 2,5 kg/ha FF Powder (NPK-bladmeststof 19-19-17)
- 10 kg/ha Ureum of 25 l/ha ureum vloeibaar.