



| Loofvernietiging in pootaardappelen | |
|---|--|
| Volvelds spuiten | Eerst klappen en daarna spuiten |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 4 - 7 dagen eerder starten vergeleken met het oude Reglone-moment➤ Gewas open spuiten met: 1,0 l/ha Spotlight Plus➤ Na 4 - 7 dagen spuiten met: 1,0 l/ha Affinity Plus➤ Na 4 - 7 dagen eventueel spuiten met: 0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Olie | <ul style="list-style-type: none">➤ Gewas eerst klappen + 0,5 l/ha Spotlight Plus rijenbespuiting of➤ Volgende dag spuiten met: 1,0 l/ha Spotlight Plus➤ Na 4 - 7 dagen spuiten met: 1,0 l/ha Affinity Plus➤ Na 4 - 7 dagen eventueel spuiten met: 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie |

Voor een optimaal resultaat zijn de volgende zaken belangrijk:

- Probeer zoveel mogelijk blad en stengel te raken: gebruik hiervoor voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het gewas.
- Spuit bij voorkeur aan het begin van een zonnige dag (gewas mag dauwnat zijn).

Houd tot en met de loofdoding aandacht voor Phytophthora en voeg altijd de sterkste knolbeschermer toe bij het doodspuiten (bijv. 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas). Let ook op de luizen tot het gewas voldoende is afgestorven. Spotlight Plus en Affinity Plus mogen 1x worden toegepast. Quickdown mag 2x worden toegepast.

Reinig de spuit direkt na toepassen met Primaclean of All Clear Extra.

Kiemremming in consumptieaardappelen

Het moment van toepassen van MH in vroege bewaaraardappelen (bijv. Innovator) alsook tafelaardappelen is/zal binnenkort aan de orde zijn. Met de MH-bespuiting wordt een goede basis gelegd voor succesvolle bewaring. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.

Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een belangrijk deel het eindresultaat in de bewaring bepaalt, staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste inzetmoment van MH:

- Spuitmoment: 3 - 5 weken voor verwachte loofdoding of afsterven van het gewas in verband met voldoende opname in de knol.
- Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei - begin afrijping. Controleer de knolgrootte: 80% minimaal 30 mm doorsnee.
- Spuit op een droog gewas bij groeiende omstandigheden. Dauwnat na de bespuiting is geen probleem. Bij warm weer (>25 graden) in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het spuiten.
- MH altijd apart verspuiten met 300 - 500 l/ha water.
- Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.

Advies aardappelen:

- Crown MH: 11,0 l/ha of
- Royal MH60: 5,0 kg/ha

Trips in uien

In de meeste percelen zijn inmiddels minimaal 2 bespuitingen met Batavia uitgevoerd. De werkingsduur van Batavia is 2 - 3 weken. Herhaal deze bespuiting tijdig om tripsschade door de larven voor te blijven. Ons advies:

- 0,75 l/ha Batavia + 1,0 - 2,0 l/ha Olie

Bij aanwezigheid van veel volwassen trips en larven kan ook Tracer worden ingezet:

- 0,2 l/ha Tracer + 0,25 l/ha Vivolt of 0,2 l/ha Tracer + 3 l/ha Biosweet

Gebruik bij beide bespuitingen voldoende water om zoveel mogelijk ook tussen de pijpen te komen. Spuit daarbij liefst 's morgens vroeg of 's avonds laat.

Groenbemesters

Voor het GLB hebben we diverse kant-en-klare mengsels op voorraad liggen om aan de vergroeningseis te voldoen. Daarnaast hebben we ook enkelvoudige groenbemesters, zoals bladrammenas, gele mosterd, Engels en Italiaans raaigras, Facelia en Japanse haver op voorraad liggen. Vraag uw adviseur om de mogelijkheden.