



VAN OVERLOOP B.V.
gewasbeschermingsmiddelen

NIEUWSBRIEF

nr. 23 20 september 2022

Onkruidbestrijding Engels Raaigras

Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u *direct* na zaai een bespuiting uitvoeren met 1,2 - 1,6 l/ha Trammat 500. Bij Engels raaigras wat vanonder een dekvrucht komt, kan óver het gewas ook Oblix 500 worden gespoten. Om bovenstaande onkruiden te bestrijden kan aan deze bespuiting Primus, Primstar of Tapir worden toegevoegd. Vraag uw (graszaad)adviseur om een passend advies.

Slakkenbestrijding

Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. Iroxx is een langwerkende, traag oplossende korrel ten opzichte van Derrex.

Advies Derrex/Iroxx:

- Strooi tijdens het zaaien of strooi direct na het zaaien slakkenkorrels als slakkenvraat wordt verwacht.
- Dosering 7 kg/ha
- Het kan noodzakelijk zijn om de behandeling te herhalen.

Onkruidbestrijding weiland

In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties:

Een brede combinatie is:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij eerstejaars grasland)

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro

Bij alleen zuring kan gespoten worden met:

- 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top

Onkruidbestrijding wintergerst

Ons advies voor wintergerst:

- Spuit vanaf opkomst in het 1-2 bladstadium 0,5 - 0,6 l/ha Herold + 0,15 - 0,2 l/ha AZ500 + eventueel een insecticide. Ook als er een gerstevergelingsvirus-tolerant ras is gezaaid, is het aan te raden om bij aanwezigheid van bladluizen een bespuiting met een insecticide uit te voeren om de zuigschade te beperken.

Knaagdierbeheersing

Nu de dagen weer kouder en natter worden vraagt de bestrijding van ongedierte weer de aandacht. Voor de niet-chemische bestrijding van ratten en muizen hebben we o.a. diverse muizen- en rattenklemmen, voederbakken (waar klemmen of rodenticiden in geplaatst kunnen worden) en vangkooien.

Als deze bestrijding onvoldoende helpt kan alleen binnen gebouwen gebruik gemaakt worden van *chemische* middelen: de zogenaamde rodenticiden. Ook hiervan hebben we diverse producten op voorraad. Belangrijk hierbij is dat men zorgt dat er voldoende 'giftig lokaas' in de voederbakken aanwezig is en dat men pas stopt als er geen opname meer is van de rodenticide. Op plaatsen waar veel alternatief voedsel aanwezig is kan vaak effectiever gewerkt worden met vallen of klemmen.