



VAN OVERLOOP B.V.
gewasbeschermingsmiddelen

NIEUWSBRIEF

nr. 26 1 november 2022

Bladluizen in granen

Momenteel worden er in wintergerst en vroeggezaaide wintertarwe bladluizen gevonden. Deze bladluizen kunnen het dwergvergelingsvirus overbrengen. Bladluizen die het virus dragen blijven voor langere tijd “besmet”. Vooral bij de huidige hoge temperaturen blijven de bladluizen actief en kan de tarwe of gerst geïnfecteerd worden. Vooral percelen in de nabijheid van maïspcelen, grasgroenbemesters, japanse haver en graanopslag en percelen in de luwte dienen extra gecontroleerd te worden.

Meer dan 20 verschillende bladluissoorten kunnen mogelijk drager van het virus zijn, maar de voornaamste die in onze streek voorkomen zijn:

- Vogelkersluis (zie foto)
- Roos-grasluis (zie foto)
- Grote graanluis (zie foto)

Kontroleer uw gewas en bestrijdt, indien aanwezig, de bladluizen in een vroeg stadium.

Ons advies:

- 0,25 l/ha Decis (2x per teeltcyclus)
- 0,05 l/ha Karate Zeon (1x per teeltcyclus)
- 0,2 l/ha Sumicidin Super (2x per teeltcyclus)
- 0,14 kg/ha Teppeki (2x per teeltcyclus)

Deze middelen kunnen eventueel gecombineerd worden met een na-opkomst onkruidbestrijding. (zie vorige nieuwsbrief)



Vogelkersluis



Roos-grasluis



Grote graanluis