



### **Onkruidbestrijding tarwe**

Voor een goed resultaat en om opbrengstderiving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei. De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 0,2 kg/ha Capri Twin + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Cossack Star + 1,0 l/ha Olie
- 0,2 kg/ha Atlantis Star + 75 ml/ha Hussar + 1,0 l/ha Olie.

De olie dient een veresterde plantaardige olie te zijn: bijv. Tipo-olie. Deze middelen kunnen het best gespoten worden bij groeizaam weer met een hoge RV.

Voor verder ontwikkelde tarwe zou er eventueel 1,0 l/ha CeCeCe kunnen toegevoegd worden. Raadpleeg uw adviseur voor een passend advies.

### **Onkruidbestrijding graszaad**

Als de grond berijdbaar is kan een onkruidbestrijding worden uitgevoerd om onkruiden zoals klein kruiskruid, kamille en klimopereprijs tijdig te bestrijden. Hierbij kunnen combinaties van Primstar, Primus, Starane Top, Tapir of Fox worden ingezet. Enkel voor Engels Raaigras heeft Fox480SC geen vrijstelling gekregen. Ook een nieuw middel maakt zijn intreden, de Renitar. Dit middel is zowel toegelaten in graszaad als in winter- en zomergraan. De Renitar dient toegepast te worden in een dosering van 0,75 l/ha met een DRT 95% en werkt sterk tegen paarse dovenetel, hoenderbeet, melganzevoet, kleefkruid.

### **Groei regulatie wintertarwe**

De eerste wintertarwe percelen zijn toe aan de eerste groei regulatie (T0).

Het advies is:

- 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 - 1 l/ha CeCeCe
- 1 l/ha CeCeCe
- 0,3 - 0,4 l/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe

Wanneer het nodig is, kan er eventueel een ziektebestrijding hieraan toegevoegd worden:

- Bij aanwezigheid van gele roest: 0,75 l/ha Retengo
- Bij aanwezigheid van septoria: 1,0-1,5 l/ha Stamento

### **Groei regulatie wintergerst**

De groei regulatie in wintergerst kan met Trimaxx of Prodax uitgevoerd worden. Het advies is:

- 0,5 - 0,8 l/ha Trimaxx
- 0,6 - 0,75 kg/ha Prodax + 0,5 l/ha CeCeCe bij 1<sup>e</sup> knoop en 0,4 kg/ha Prodax bij 2<sup>e</sup> knoop.

Voeg hier 1,0 - 2,0 l/ha Mangaannittraat aan toe.

### **Onkruidbestrijding vlas**

Spuit direct na zaai 0,75 - 1,0 l/ha Callisto + 0,3 l/ha Grounded. Let op: Callisto is een KUG-toelating: het toepassen hiervan is op eigen risico.

### **Onkruidbestrijding vroege wortelen**

Ons advies: 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 2,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Challenge. De laagste dosering van Centium geldt voor lichte gronden.

### **Onkruidbestrijding bieten**

Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide. Hierdoor worden de onkruiden vanaf de kiemfase al aangepakt.

Ons standaard advies:

2,0 l/ha Goltix, eventueel aangevuld met 50 - 100 ml/ha Centium

3,0 - 3,5 l/ha Kezuro

3,0 l/ha Goltix Queen

Vraag uw adviseur om een passend advies.