



Ziektebestrijding in tweedejaars plantuinen

Wanneer de plantuinen elkaar raken in de rij kan men starten met de ziektebestrijding.

Vanaf dit teeltseizoen is er voor het middel Infinito een KUG toelating voor eerste- en tweedejaarsplantuinen tegen de bestrijding van valse meeldauw. Er wordt geadviseerd om deze in te zetten aan het begin van het fungicideschema.

Tegen de valse meeldauw zijn er momenteel 4 middelen toegelaten:

Middel	Werkzaam tegen	Aantal toepassingen	Dosering	Interval	veiligheidsstermijn
Zorvec Endavia	Valse meeldauw, Papiervlekken	3x	0,5 l/ha	7 dagen	28 dagen
Orondis Plus Amistar	Valse meeldauw, Bladvlekken, Papiervlekken, Stemphylium	3x	0,2 l/ha + 1 l/ha	7+21dagen	7+14 dagen
Fandango	Valse meeldauw, Bladvlekken, Papiervlekken, Stemphylium	4x	1,25 l/ha	5 dagen Max 3 bespuitingen opvolgend.	14 dagen
Infinito	Valse Meeldauw	3x	1,6l/ha	7 dagen	7 dagen

Al deze middelen dienen preventief ingezet te worden; de curatieve werking is zeer miniem.

Daarnaast hebben we nog met de Frac-regels (resistentieregels voor fungiciden) te maken.

Deze zijn voor de uien de volgende regels:

- maximaal 33% van alle bespuitingen mag een Zorvec-bevattend product zijn; dus bij 9 bespuitingen mag er maximaal 3x Zorvec of Orondis Plus worden gespoten.

- maximaal 50% van alle bespuitingen mag een strobilurine-bevattend product (Fandango, Amistar, Kenbyo en Signum) zijn.

Aan bovenstaande fungicide kunnen ook bladmeststoffen worden toegevoegd:

- Mangaannitraat (1,0 l/ha) de eerste twee bespuitingen toevoegen.
- Quadro (1,5 l/ha), deze meststof bevat naast mangaan en zink ook koper en zwavel. Ook Quadro dient een aantal malen preventief te worden gespoten.
- Vitalasol Gold (3 l/ha) kan ook prima worden gecombineerd. Vtitalasol Gold bevat Koper, mangaan en zwavel.

Als uitvloeier kan aan de fungiciden worden toegevoegd:

- 0,25 l/ha Vivolt
- 0,15 l/ha Silwet Gold
- Indien er neerslag voorspeld wordt, kunt u de fungiciden beter laten hechten door Promotor (0,3 - 0,5 l/ha) toe te voegen aan een bespuiting.

Aan Fandango kan beter geen uitvloeier/hechter worden toegevoegd.

Wortelonkruiden in tarwe

In de vroege tarwe-rassen verschijnt binnenkort het vlagblad al, waarbij de tarwe in het algemeen snel ontwikkeld. Dus tijd om in de tarwe de wortelonkruiden zoals melk-/akkerdistel, veenwortel, haagwinde, kattenstaart/heermoes, hoefblad en aardappelopslag te bestrijden:

Ons advies:

- 1,0 l/ha Tapir + 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,3 l/ha Starane Top toevoegen)
- 45 gr/ha Traton + 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)
- 2,0 l/ha MCPA (bij aardappelopslag 0,6 l/ha Starane Top toevoegen)

MCPA tot één week voor het in de aar komen toepassen; Traton SX, Starane Top en Tapir uiterlijk tot einde vlagblad gebruiken.

Remming Engels raaigras

Circa 10 dagen na het loskomen van de 1^e knoop is het moment van toepassing voor een groeiregulatie. Hiervoor adviseren wij:

- 0,5l - 0,8l/ha Trimaxx

Vraag uw adviseur naar een passend advies.

Storl verpakkingen

Vergeet niet om via www.storl.nl uw volle zakken met lege verpakkingen (schoongemaakt) aan te melden.

Uiteraard zijn de lege zakken bij ons verkrijgbaar.