



### Ziektebestrijding wintertarwe (T2 bespuiting)

Bij de vroeg gezaaide tarwe en vroege rassen is het vlagblad nu bijna volledig aanwezig. Kijk niet naar de lengte van de tarwe, maar naar het stadium “vlagblad volledig uit” (T2) en het tijdstip van de vorige bespuiting. De werkingsduur van de eerste fungicidebespuiting (T1) bedraagt bij gebruik van de volle dosering maximaal 3 à 4 weken. Middelen voor de T2-bespuiting met een lange werkingsduur zijn:

- 1,0 + 1,0 l/ha Priaxor Duo (1 combipak is voor 5 ha)
- 1,0 l/ha Elatus Era
- 1,1 l/ha Ascra Xpro

Bij aanwezigheid van graanhaantje en/of bladluizen:

- 0,05 l/ha Karate Zeon of 200 cc/ha Sumicidin Super
- 0,25 kg/ha Pirimor (pakt geen graanhaantje)
- 140 gr/ha Teppeki (pakt geen graanhaantje, wel een langwerkend middel)

### Groeiremming en ziektebestrijding zomergranen

In zomertarwe kan tussen het stadium einde uitstoeling en de eerste knoop een halmverkorting uitgevoerd worden met

- 1,0 l/ha CeCeCe
- 0,2l/ha Trimaxx + 0,5l/ha CeCeCe.

Het is raadzaam om onder de huidige omstandigheden een ziekte bestrijding uit te voeren.

- 1 - 1,2 l/ha Soleil + 1l/ha Stavento

In zomergerst kan op het 1<sup>e</sup> knoopstadium geremd worden met 0,4 - 0,6 l/ha Trimaxx. Hieraan kan tegen o.a. Ramularia, netvlekkenziekte en dwergroest 1,25 l/ha Balaya worden toegevoegd. Hieraan kan mangaan toegevoegd worden.

### Onkruidbestrijding suikerbieten

Ter *versterking* op moeilijke onkruiden kunt u vanaf het 2 echte bladeren de mix versterken met:

- 75 - 150 gr/ha Safari DuoActive (= Safari + Lenacil), 3 toepassingen, meerwaarde op uitstaande melde, melganzevoet, duivekervel, varkensgras, zwaluwtong, bingelkruid, hondspeterselie, kamille en kleefkruid.
- 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel, 3 toepassingen, meerwaarde op perzikkruid, zwarte nachtschade, hondspeterselie en aardappelopslag.
- 0,3 - 0,6 l/ha Tanaris (= Frontier + quinmerac), 3 toepassingen, meerwaarde op kamille, duivekervel, hondspeterselie, uitstaande melde, melganzevoet, zwarte nachtschade en kleefkruid.

Vanaf 4-bladstadium kan de mix tegen nakiemers aangevuld worden met 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima. Vraag uw adviseur om een passend advies.

### Bladluizen in suikerbieten

Momenteel zijn de eerste groene perzikbladluizen als zwarte bonenluizen gesignaleerd in de bieten. De volgende luizenmiddelen, die aan de onkruidbestrijding kunnen worden toegevoegd, zijn momenteel toegelaten:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Batavia	2	14 dagen	0,45 l/ha