



### **Trips in plantuïen**

Voer bij het zien van de eerste trips larven in de plantuïen een bestrijding uit. Batavia heeft een goede werking op de trips-larven, maar dient *preventief* te worden gespoten onder groeizame omstandigheden. Controleer uw gewas goed en voer tijdig een bespuiting uit.

Ons advies:

- 0,75 l/ha Batavia + 1,0 - 2,0 l/ha Tipo

Gebruik hiervoor voldoende water.

### **Bruine bonen**

Bij aanwezigheid van melden en zwarte nachtschade kan vóór zaai 8 l/ha Bonalan ingewerkt worden. Dit heeft tevens een nawerking op grassen. Direct na zaai kan een bespuiting uitgevoerd worden met 0,15 - 0,2 l/ha Centium. Voeg eventueel Roundup Dynamic toe op bovenstaand onkruid. Zorg ervoor dat de bonen 3 cm. diep gezaaid zijn om een gewasreactie te voorkomen.

### **Zwarte roest bestrijding Engels raaigras**

Ook voor 2023 is er opnieuw vrijstelling verleend voor het de inzet van Amistar tegen de bestrijding van zwarte roest in de zaadteelt van Engels raaigras. Deze loopt van 1 mei 2023 tot 28 augustus 2023.

Preventief is zwarte roest goed te bestrijden, curatief is dit echter lastig. Begin daarom tijdig met de eerste bestrijding:

- 1,0l/ha Amistar

Laat de interval niet groter worden dan 3 weken om het gewas gezond te houden.

### **Onkruidbestrijding vlas**

Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid:

- 2,5 l/ha Basagran + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is mogelijk)
- 60 ml/ha Hussar + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai *niet* mogelijk)

De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden met 1,0 l/ha Lontrel zonder olie.