



Vooraankondiging spuitlicentie verlenging

Ook dit jaar wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd voor het verlengen van de spuitlicentie. Zet 16 augustus alvast in de agenda om het onderdeel Veiligheid & techniek te volgen voor uw spuitlicentie. Verdere informatie volgt.

Ziektebestrijding in wortelen

Tijdig voor het sluiten van het gewas kan de eerste ziektebestrijding worden uitgevoerd. Vanwege afzet van de wortelen zijn we beperkt in de keuze van de middelen. Ons advies:

- 1^e bespuiting: 1,0 l/ha Amistar Top + 10 kg/ha Microtop Bitterzout + 2,5 kg/ha Solubor
- 2^e bespuiting: 0,75 kg/ha Signum + 10 kg/ha Microtop Bitterzout
- 3^e bespuiting: 1,0 l/ha Amistar Top + 10 kg/ha Microtop Bitterzout
- 4^e bespuiting: 0,75 kg/ha Signum + 10 kg/ha Microtop Bitterzout

Kiemremming in consumptieaardappelen

Het moment van toepassen van MH in vroege bewaaraardappelen (bijv. Innovator) alsook tafelaardappelen is/zal binnenkort aan de orde zijn. Met de MH-bespuiting wordt een goede basis gelegd voor succesvolle bewaring. Ook zorgt MH voor minder aardappelopslag in volgteelten.

Omdat een juist uitgevoerde toepassing voor een zeer belangrijk deel het eindresultaat in de bewaring bepaalt, staan hieronder enkele aandachtspunten bij het bepalen van het juiste inzetmoment van MH:

- Spuitmoment: 3 - 5 weken voor verwachte loofdoding *of* afsterven van het gewas in verband met voldoende opname in de knol.
- Toepassen op een vitaal en egaal gewas. Na de bloei - begin afrijping. Controleer de knolgrootte: 80% minimaal 30 mm doorsnee.
- Spuit op een droog gewas bij groeizame omstandigheden. Dauwnat na de bespuiting is geen probleem. Bij warm weer (>25 graden) in de avond spuiten. Minimaal 10 uur droog na het spuiten.
- MH altijd apart verspuiten met 300 - 500 l/ha water.
- Geen uitvloeier toevoegen bij aardappelen.

Advies aardappelen:

- Crown MH: 11,0 l/ha of
- Royal MH60: 5,0 kg/ha

MH-bespuiting uien

In de vroeg gezaaide uien zal op korte termijn de MH bespuiting weer aan de orde zijn. Spuit wanneer het gewas begint te strijken (maximaal 10-15%). Het loof neemt het middel dan goed op. Te vroeg spuiten geeft holle uien, te laat spuiten kan leiden tot een verminderde opname van MH.

Omstandigheden tijdens toepassen: Spuit op een groeiend en niet afgehard gewas. Spuit op een moment dat de RV minimaal 70% is. Na de bespuiting moet het minimaal 10 uur droog zijn. *Ons advies:*

- MH apart verspuiten onder groeizame omstandigheden
- Bij warme omstandigheden de bespuiting liefst 's avonds uitvoeren
- Spuit met 350 - 400 liter water per hectare met een fijne druppel voor een goede bladbedekking
- MH + uitvloeier niet mengen met andere middelen; wel kan eventueel een pyrethroïde tegen trips worden toegevoegd.

Het gewas moet na de bespuiting zeker 14 dagen groen en gezond blijven voor een volledige opname van de MH in de ui.

Advies uien:

- 8,3 l/ha Crown MH + uitvloeier of
- 3,75 kg/ha Royal MH 60 + uitvloeier

Vraag uw adviseur om een passend advies.