



Phytophthora bestrijding aardappelen

Gezien het huidige weer is het raadzaam om de interval van uw phytophthora bestrijding met 1 a 2 dagen te verkorten. Indien nodig:

- 0.2 kg/ha Curzate Partner

Loofvernietiging pootaardappelen

<ul style="list-style-type: none">➤ Start timing om in de juiste maatsortering te blijven➤ Gewas open spuiten met: 1,0 l/ha Spotlight Plus + 2 l/ha olie➤ Na 4 - 7 dagen spuiten met: 1,0 l/ha Affinity Plus+ 2 l/ha olie➤ Na 4 - 7 dagen eventueel spuiten met: 0,8 l/ha Quickdown + 2 l/ha Olie	<ul style="list-style-type: none">➤ Gewas eerst klappen + 0,5 l/ha Spotlight Plus rijenbespuiting of➤ Volgende dag spuiten met: 1,0 l/ha Spotlight Plus + 2 l/ha olie➤ Na 4 - 7 dagen spuiten met: 1,0 l/ha Affinity Plus+ 2 l/ha olie➤ Na 4 - 7 dagen eventueel spuiten met: 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie
--	---

Voor een optimaal resultaat zijn de volgende zaken belangrijk:

- Probeer zoveel mogelijk blad en stengel te raken: gebruik hiervoor voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het gewas.
- Spuit bij voorkeur aan het begin van een zonnige dag (gewas mag dauwnat zijn).

Houd tot en met de loofdoding aandacht voor Phytophthora en voeg altijd de sterkste knolbeschermer toe bij het doodspuiten (bijv. 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5 l/ha Canvas). Let ook op de luizen tot het gewas voldoende is afgestorven. Spotlight Plus en Affinity Plus mogen 1x worden toegepast. Quickdown mag 2x worden toegepast.

Reinig de spuit direct na toepassen met Primaclean of All Clear Extra.

Ziektebestrijding cichorei

Bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. De bladziekten die in cichorei kunnen voorkomen zijn echte meeldauw, bruine roest, alternaria en stemphylium. De volgende middelen zijn hiervoor toegelaten:

Middel	Dosering	Aantal toepassingen	Interval	Veiligheidstermijn
Flint	0,25 kg/ha	2	21 dagen	21 dagen
Signum	1,5 kg/ha	2	14 dagen	14 dagen
Amistar Top	1,0 l/ha	2	21 dagen	30 dagen
Serenade	8l/ha	6	5 dagen	n.v.t.

Aan deze bespuiting kan een bladmeststof worden toegevoegd. Goede resultaten worden gezien bij 2l - 4l/ha "Optima Sugar Plus". Deze Meststof bevat N, Ca, Mn en Mg en veel andere spoor elementen wat zorgt voor een verbeterde suikerproductie. Daarnaast zorgt hoge hoeveelheid Calcium voor een hogere inulinewaarden en stress tolerantie.

Ziektebestrijding bieten

Het is belangrijk om 3 weken na de eerste ziektebestrijding weer een ziektebestrijding uit te voeren in de bieten, hiervoor adviseren wij het volgende:

- 1,25l/ha Belanty + 0,5l/ha Tern + 0,4l/ha Promotor
- 1l/ha Spyrle + 0,4l/ha Promotor
- 1l/ha Bicanta + 0,4l/ha Promotor
- 5l/ha Microthiol (of 3l/ha in combinatie met een andere fungicide)

De laatst genoemde, Microthiol is een zwavelfungicide en vooral sterk tegen Cercospora en Echte meeldauw. Dit blijkt uit onderzoek in samenwerking met het IRS.

Uiteraard kan aan de ziektebestrijding de nodige bladmeststoffen worden toegedient. Vraag uw adviseur om een passend advies.