



Phytophthora situatie

Ook met de hoge temperaturen vinden we nog nieuwe phytophthora aantastingen. Houdt u perceel aardappelen goed in de gaten en twijfel niet om kort voor het einde van de teelt nog met curatieve middelen in te grijpen.

Loofdoding van consumptieaardappelen

Het doodspuiten van aardappelen is binnenkort weer aan de orde. Ons advies hiervoor is: Spuit het gewas open met:

- 0,8 l/ha Quickdown + 2,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top

Na 5-7 dagen kan er dan, indien nodig, gespoten worden met:

- 1,0 l/ha Spotlight Plus + 1,0 l/ha Olie + 0,5 l/ha Ranman Top of 0,5l/ha Canvas.

Bij een gewas met phytophthora aantasting wordt geadviseerd om ook nog een curatieve fungicide toe te voegen bij het doodspuiten.

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om aan het begin van een zonnige dag te spuiten met voldoende water, lage rijsnelheid en juiste spuittechniek voor een optimale bedekking en indringing in het gewas.

Twee zaken verdienen extra aandacht bij de loofdoding: voorkomen van drift en een zorgvuldige tankreiniging.

Gewasbeschermingsmonitor

U bent verplicht binnen twee maanden na een teelt een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. Daarin dient u aan te geven of de getroffen teeltmaatregelen hebben gewerkt en welke gewasbeschermingsmiddelen u hebt gebruikt. Indien u nog een gewasbeschermingsmonitor moet invullen dan kunt u een exemplaar vragen bij uw adviseur.

Zaaizaad wintergranen

Het is nog vroeg in het jaar maar toch is het goed om al vooruit te kijken naar de rassenkeuze voor wintergerst /-tarwe. Kijk bij de rassenkeuze naar opbrengst, ziekte- en legeringsgevoeligheid en vroegheid. Bespreek dit met uw adviseur.

Heeft u voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen leveren. Ook behandelde tarwe met Latitude XL is mogelijk. Vraag uw adviseur naar de folder "info zaaigranen 2023".

Slakkenbestrijding

Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. Iroxx is een langwerkende, traag oplossende korrel ten opzichte van Derrex.

Advies Derrex/Iroxx:

- Strooi tijdens het zaaien of strooi direct na het zaaien slakkenkorrels als slakkenvraat wordt verwacht.
- Dosering 7 kg/ha
- Het kan noodzakelijk zijn om de behandeling te herhalen.